




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2638/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2638/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2638/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2638/A

A. XVIII. O. 121


2638


A

6691

m. 220

147





47002

PERIOCHE

SEPTEM LIBRORVM
primorum Methodi Galeni,
cum quibusdam tum ab eo
dē, tum alijs authoribus tra-
ductis (vt vocant) receptio-
nibus, per Antonium de Me-
ry Medicum.

PARISIIS
Apud Simonem Colinaeum

I 5 3 4

ANTONIUS

DE MERY VIMACVS

Roderico Ferdinãdo ab Al
mãda, Regis Lusitaniæ fide
lis. in Gallias legato, s. p. d.



Vm nuper cogitarẽ
hanc nostram in se
ptẽ Galeni Metho
di priores commen
tarios periochen ty
pis mandare, subiit mihi in men
tem honestissimũ esse viros bo
narum artium patronos monu
mentis literarijs vicissim coho
nestare. Quapropter Roderice
prudentiss. quũ iam à multis an
nis nobis cõstiterit quã huma
niter ad te velut sturnatim (dũ
ob grauem egestatem patriã re
peterent) conuolantes discipulis
narum meliorum studiosos ex

ceperis, eosque tuis opibus onus-
 stos Luteciā ad illustrandas suo-
 rum ingeniorum dotes remise-
 ris: profectō optimum fore spe-
 rauimus si tuæ integrę fidei hos
 nostros labores consecraremus.
 Cuinam mortalium quæso, aut
 melius aut fidelius hoc ipsum cō-
 mittere possum, quā cui rex
 Lusitanorū aplissimus tot opes,
 tot in Antuerpiam nauigia pro-
 pter viri egregiā probitatem cō-
 credidit? Cuius sanē in rebus ge-
 rendis mirabilem sagacemq; in-
 dustriam cum intellexisset, ecce
 secretiora, & quæ non nisi viro
 magni ingenij cōmittuntur, de-
 mandat, legatūmq; ad Christia-
 niss. Galliarum Regem institu-
 it: in qua re profectō ea & fide
 & prudentia se gerit, vt etiā ex-
 teris nationibus admirationi, Re
 a.ij.

gi autem suo ac Lusitanæ genti
summo sit ornamento. Quid? nō
ne anteaquam ex Antuerpia ad
Gallos legatū te recepisses, iam
penē Gallia totāque Lusitania
acri & hostili bello ob insignes
vtrunque deprædationes fremes-
bat? quod tua singulari pruden-
tia extinxisti, & principum ani-
mos ita composuisti, vt quanto
res turbulētior erat, eò sanē (ma-
gno quidem vtriusque gentis rei
publicæ commodo) pacatior,
& quietior nunc composita pers-
sistat. O admirabilem & nun-
quam satis commendatum vi-
rum: qui, quod ferrum non po-
test, sua sedula cura mirandāque
solertia effecit. Vnde nunc profe-
cto omnia lætiora conspiciun-
tur. Antea sanē vix tuto nauiga-
batur, aut securus in Hispaniam

Galliã' ve patebat accessus. Ad
de multorum præclara ingenia
per totam Lusitaniam segniter
torpescencia, quæ, postquam om
nem tumultum adeo bene com
posuisti, Rex ille vester literato
rum amantissimus, in hanc no
stram academiam donis plane
regiæ excolenda traduxit, eisque
Iacobum Goueanum doctorem
Theologum ob eius fidei inte
gritatem iamdudum comproba
tam præfecit. Quare legatorum
vigilantissime frui nunc isto tuo
bono, & gaude tua prudenti in
dustria edomitum horrendum bel
lum, tuosque Lusitanos hic fan
ctiores disciplinas capeffere. Ac
cipe etiam rogo quas nunc labo
rum nostrorum primitias tibi de
uouemus. Scio enim te vno pa
trono nomine meum nil vnquam
a. iij.

periculi admissurum, quod & o-
ptamus, & animo toto cupimus.
Vale Luteciæ ex ædibus Barba-
ranis. Anno supra sesquimillesi-
mum trigesimo quarto: nostri ve-
rò Rectoratus Parisiensis men-
se tertio.

Ad Lectorem.

*Vt nullum logicæ Chrysippi sufficit ænum:
sic medicinæ operi doctæ Galenæ tuo.
Ergo, tuis si nos studiis succurrimus, hocce
Quodcūq; ædidimus perlege lector opus.*

4

PERIOCHE

PRIMI COMMENTARII
Therapeutices Galeni.

Quare in Theſſalum inuectus
ſit Galenus.



Solent bonarū artium
professores ſtatim ab
initio reddere ſuorum
laborum rationem, ne
parum accuratè (quod
noſtræ ætatis quā plu-
rimi faciunt) ſua depromere conce-
pta videantur: tum prodigioſa nō nul-
lorum ſenſa, quæ frequēter ſtudioſos
remorantur, deputare, ne quid docen-
do intercīdat, quod tradēdæ discipli-
næ obſiſtere poſſit. Cuius ſanè indu-
ſtriæ artifex præcipuus Galenus pri-
mo animorum labem deterget, quò
ſibi purū & vni veritati ſtudioſe ad-
dictū (aliorū vitijs exaggeratis) au-
ditorem inſtituat, ne vulgatæ laudis,
aut inexplebilis diuitiarū cupiditas diuitiarū
(qua nil bonarum disciplinarū amat cupiditas
a. iij.

PERIÖCHE I.

foribus magis est aduersarium oblu-
 etetur, dum præcepta sanctissimè tra-
 dūtur. Atq; ita demum inuehitur in
 humanorū corruptos mores, quòd
 neglectis dialectice, rhetorice, musis
 ce, astronomia, medicina, omnibus
 deniq; politioribus disciplinis, volu-
 ptatibus, auròq; solum inferuiretur.
 Vnde quando intellexisset Thessalū
 methodicum quotidie salutando ac
 turpiter blandiendo summatibus in-
 gentem sibi discipulorū turbam ac-
 ciuisse: dūmq; polliceretur sese bre-
 uissimo tēporis momento, vel etiam
 semestri artem totam medicam tra-
 diturum, coepit acriter in eum inue-
 hi: ea tamen seruata dicendi gravita-
 te & facundia, vt non facile iudices
 vtra in eo præluxerit, oratoria an me-
 dicina. ansam autem sibi arripuit op-
 portunam dicēdi in eum, quòd & in
 syncreticis, & ad Neronem petulans
 ter scripsisset Hippoc. noxia ac futis-
 lia plerūq; tradidisse præcepta, vt si-
 mul insinuaret non oportere medicū
 naturæ hominis cognitionem habere:
 cū tamen etiam testante Platone

Cur in
 Thessalū
 est inue-
 ctus Ga-
 lenus.

THERAPEVTICES. 5

nihil de re medica dici, nec morbus
vllus cōmode curari possit citra eius
exactam agnitionem. Sed mirum vi
deri non debet, si hoc, velut pleraq;
alia optime dicta, sit calūniatus, qui
se ipso agonothesa omnium mortu
lium primum se fore impudenter ia
ctando forte fortuna hoc epichere
mate recte collegit: Si omnium artiu
medicina est præstātissima, inter cæ
teros autē in ea vnus eminet Thes. Thessali
salus, vtiq; & hic omnes reliquarum superbia.
disciplinarū summos heroas vincit.
cuius sanē rei oppositum prima eius
hypothesis statim indicat, qua duas
in totum esse morborum species, flu
xum, & clausum temere cōtendit: cū
non morbi, sed morborum differen
tiæ potius essent dicēdæ, vt longa or
ratione Galenus logicisque demon
strat theorematis.

Methodus dicendorum in his
commentarijs.

Procedente dictione relictis ali
quantisper Thessalijs methodo
inuenire & inquirere quidpiam, esse
contrariū ei quod temere & fortuna

PERIOCHE I.

Quid est reperitur, docet. Est enim illud cum
 Methos via quadā & ordine, ita vt in disquisi-
 do inue- sitione aliquid primū sit, aliquid se-
 nire. cūdum, tertium & quartum, atq; ita
 de reliquis deinceps, quoad demum
 ad idipsum quod ab initio erat pro-

Huius o- positum peruentum sit. Quare cum
 peris pro huius curatricis methodi institutum
 positum. sit omnium morborum curationem

inuenire, ac ægra corpora in sanitatē
 vindicare, naturalēsq; partium actio-
 nes, si quæ vitiatæ sunt, corrigere, in-
 uento est opus quid primum, secun-
 dum, tertium, quartumve sit, donec
 ad affectum cui succurrere paramus
 sit peruentum: quod sane commode
 method^o fiet, si morborum omnium numerū
 ad mor- & differentias perquisierit naturalis
 borū cu- medicus. quæ sane (veluti nec aliū
 rationem generis quicquā) inuenire nemo po-
 test ipso quod diuiditur diligēti ex-
 amine prius non explorato. Quapro-
 pter ab ipsius rei essentia monitore
 Platone exordiendū est, quærēdū

Morb^o & que quid sit morbus, quidve sanitas,
 sanitas de ac tandē ad eius species & differen-
 finitur, tias accedendum. Morbus itaque est

THERAPEVTICES. 6

cum totius corporis, aut quarūdam
partium eius actio aut læditur, aut
perit. Sanitas vero est cum omnes
partes inculpate suas ædūt actiones.
Id autem facile intelligitur vnus a
ctionis oculorum exemplo, quod in
hunc modum habet: Visio est oculi
actio: oculus autem instrumentum
quod partes cōponunt similes (in-
strumentum enim est pars animalis
perfectā ædens actionem, vt oculus)
CrySTALLINUS humor præcipuū est vi-
sionis organū, quod à colore extrin-
seco prius alterari debet: alterari au-
tē non posset, nisi purus perspicuū
que foret: sed talis esse nequit, sine
quod nunc habet tēperamento. nam
vnumquodq; tale est quale est, pro-
pter calidi, frigidi, humidi, sicciq; tē-
periem: quæ dum mutatur, noxa est
actionis. cuius causa rursus peruesti-
ganda est, vt ea demum inuenta fa-
cile sese curatio insinuet: illa autem
nihil est quàm morbus, seu actionē
naturalē lædens affectus, cui vni cu-
rando dedicata est hæc de methodo
disceptatio.

Exemplū
oculi.

PERIOCHE I.

Cōtra Thessalum & Olympicum,
sanitatem & morbum male de-
finientes.

CUm itaq; iam sit demonstratū in-
perquirendis morborum & nu-
mero & differentijs, prius esse inci-
piendū ab ipsis quod queritur essen-
tia, colligendū est Thessalū & Olym-
picū nō potuisse vlla methodo spe-
cies aut numerum morborū collige-
re, vt qui statim in portu impege-
rint, dum sanitatem aut morbū de-
finire adstudentes quid esset plane
vtrunq; non intellexerunt. Nam ille
sanitatē & morbū sub diuerso gene-
re constituit, cuius sectatores actio-
nem firmam sanitatē, morbum au-
tem non actionis læsionem & infir-
mitatem, sed corporis certum affe-
ctum esse defenderunt: quorum de-
mētiā omnes vel etiam idiotæ pro-
tinus intelligunt: vt qui plane sciant

Cōtraria hæc inter se esse contraria, quæ sub
quæ sunt. eodem genere (dum modo ipsa gene-
ra nō sint) Aristoteles locauit. Olym-
picus autem sanitatem definiuit affe-
ctū, qui sit morbi absentia: morbum

vero mutationē à naturali, ī id quod præter naturā sit, stabilē. Cui⁹ itē error similiter atq; in alijs deprehēditur, vel morb⁹ erit quoq; affect⁹ corporis in absentia sanitatis: quod rursus absurdum erit, cum vtrinq; non quid sit id quod quæritur, sed quid non sit, doceatur. quare si quis medēdi finem sit vnq̃ assecuturus, hortamur vt primum illud in arte velut elementū, id est, quid sanitas quidve morbus sit, diligēter examinet: quorū vtrunq; affectus est & causa: hic culpata, illa vero integræ actionis.

Quatuor esse in hac methodo ordine constituenda.

Quia igitur iam palam factū est quā à scopo aberrant, dum curare sperant methodo isti Thessalij, nunc tempestiuū est docere, quatuor esse in hac disputatiōe quæ pro Causa, affixime inter sese habeātur. Primū satisfectus, an ne omniū est corporis affect⁹, vnde cōtio, symptomata prodeunt, integræ quidem ptoma, dum ille est naturalis: si vero præter ordine se naturam fuerit, nullas aut plane vias habent, tias progignit. Secundum itaque

PERIOCHE I.

horum est actio, quæ est affectuū so-
boles. Tertium ab hoc est caussarum
genus quæ affectus rursus à quibus
prodibant actiones generant. Nam
quam rationem habent affectus ad
actionem, hanc habet causa ad affe-
ctum: eo tamen discrimine, quòd af-
fectus cū actione necessario manet,
eius vero affectus qui actionem im-
pedit causæ possunt quidem nō esse,
vt in febre ephemera ab æstu solis:
possunt rursus & adhuc manere, vt
in febre putrida ab obstructione.

Sympt^{ma} mul-
tiplex. Quartum ab his genus est sympt^{ma}
matum quæ diuersas corporum pas-
siones necessario sequuntur, siue hæ
secundum naturam, siue contra hæ-
beant. Nam functionis vitiū est in-
signe morbi sympt^{ma}. Quæ verò
aliter eueniunt: vt colores, renixus,
aut tumor in phlegmone, sympt^{ma}
mata generatim capta dicuntur, eas-
démq; propria ac familiaria appella-
ri possunt. His præterea tertium
sympt^{ma}atis genus adiungi debet
quod fortè incidens vocari solet: vt
sunt immodica excremētorum tum

THERAPEVTICES. 8

retentio tum etiam expulsio. In salu-
brium vero siue (vt dicitur) morbi fi-
carum caussarū quædam aut in cor-
pore animalis consistunt, quæ inter-
næ seu antecedentes vocantur: aut ex-
trinsecus accidunt, quas primitiuas
nuncupamus. quæ omnia vnico hoc
exēplo rudiores doceamus: Esto di-
cat aliquis phlegmonē in oculis esse
se affectum præter naturam: visionē
autē læsam, insigne morbi sympto-
ma: ruborem vero, tumorem, tēsi-
onem & renixum, proprium ac fami-
liare symptoma: sanguinis postre-
mo redundantiā, antecedentē phle-
gmones causam, primitiuam vero
ciborum abundantiam: quibus om-
nia quæ ordine inter se habentur om-
nibus (vt spero) sunt notissima.

Exemplū
ad hæc
sympto-
mata.

Olympicum malè pathos & sym-
ptoma distinxisse.

Pathos apud Olympicum est affe-
ctus præter naturā permanens,
symptoma vero quod huic succedit.
vnde manifesta hominis deprehens-
datur temeritas, vt cui concedendū
foret & atrophiam, & cacochymiā,

PERIOCHE I.

morbose esse si permanētia addatur,
 quod tamen non fatetur: & merito
 quidem, quoniam addēdum esset si
 ab eo læderetur actio. nam quoad il-
 læsæ manent actiones, etiam si milli-
 es corpus sit alteratum, nullus tamen
 eorum affectuum morbus erit dicē-
 dus. nil enim curatur quā affectus
 actiones vitians. nam quod primum
 maximēq; optamus, est naturalis ac-
 ctio: & propter hanc, naturalē con-
 stitutionē seu affectū. audire enim,
 loqui, aut ambulare indigemus, non
 autem auribus lingua aut cruribus:
 nam si alia particula hæc agere lice-
 ret, quis linguę esset vsus? argumen-
 to quod particula demortua quę ab-
 scindi potest vt digitus, pes, aut ma-
 nus, otiosa diu nobis nō gestatur, ac
 velut extraneū pōdus circumfertur:
 hoc ipso rursū clare ostēdētes, nō
 particulis sed functionibus nos ege-
 re, eodēmq; (arbitror) modo natura-
 libus partium cōstitutionibus, qua-
 rum, vt est prius monstratum, actio
 est soboles. At redeūdū est ad Olym-
 ad morbi picum, qui persistentiam adiecit in

Actioni-
 bus, non
 particulis
 nos egere

S
 n
 t

Reditio

diffinitioe $\omega\alpha\theta\sigma\epsilon$, vt intelligat q̄ bel Olympia
le eum descripserit affectum. Non ei perma
ne qui toto corpore est couulsus, vel nētiam.
etiā dimidiata hora, est morbu per
pessus, æque ac si plurib⁹ horis talē
sustinuerit affectum: nonne apople
xia, febris, epilepsia, nominave id ge
nus, nature rei, nō temporis sunt in
dicia: alioqui, per Iouem, mirum sit
si aqua calida non fuerit, nisi perpe
tuum diem talis persisterit, aut qui
febrijt sex horas, non febricitarit, q̄
longius malum nō perpessus fuerit:
quod sane dicere vt est extremæ de
mentia, ita profecto doctis ac deli
catis auribus molestum est audire.
Quocirca finem huic primæ Galeni
Therapeutices perioche imponim⁹,
quā breuiter pstrinxim⁹ cur sit Gal.
inuectus in Thessalū, quid esset præ
terea methodo inuenire, propositū
que librorum methodi esse omniū
morborum curationem inuestigare,
ad quā sane quatuor esse necessaria,
quæ sese ordine habeant, causas, af
fectus, actiones, & symptoma di
ximus. Postremoque Olympici in dictorū.

b.j.

PERIOCHE II.

distinguendo morbo à symptōmate,
te, infantiam deteximus.

Finis primæ perioches.

PERIOCHE SECUNDI LIBRI
Therapeutices Galeni.

EOrum quæ corporibus ægris
accidūt quatuor esse differen-
tias libro superiore palam fe-
cimus, quæ hic denuo sunt repeten-
dā, vt quæ hoc secundo progymna-
mate tradituri sumus ita cohæreant,
vt vnū ab altero enasci videatur. Ea
enim sunt, affectus, actio, caussa, &
symptōmata. quorum omnium vnū
est morbus, non quidem symptōma
ipsum, non caussa: ergo est vel actio,
vel deniq; affectus: Atqui actio non
curatur, sed morbus: nemo enim vn-
quam claudicationem curauit: quare
affectus est morbus dicendus: ad quē
vnum curationis consilium omnino
dirigitur. Is enim vt varius est, ita va-
rijs quoq; nominibus est appellatus:
idque à loco affecto, vt Pleuritis, Is-
chias, Arthritis, Podagra: subinde à

THERAPEVTICES. 10

symptomate, Tinesmos, Dyspnœa, Paraphrosyne: sæpe ab ambobus, Cephalalgia, Odontalgia, Hysteralgia: sæpenumero à causâ putata, Melancholia, Leucophlegmatias hydëros: nōnunquā à similitudine ad aliquid, Elephantiasis, Cācer, Meliceris, Staphyle. At numerare omnia superuacuum esset, nam multi à proprijs differentijs, veluti ab externis etiam symptomatis nomina sibi sortiuntur, quibus supersedeo, cōtentus admonuisse, libros Methodi Galeni nemini esse suscipiendos, nisi prius diligenter euoluerit libros de morborum, symptomatumq; differentijs & causis, qui sane tibi erunt futuri duces optimi ad eam, quæ est huius nostri instituti finis precipuus, omnium morborum curationem.

Quid Pathos, quidve morbus sit, cui vni paratur remedia, docetur.

DVol'superaddēda esse in hac methodo, ijs tribus præter naturā ex Galeno colligitur. Alterū quid pathos à morbo differat, alterum quod
b. ij.

PERIOCHE II.

sine corporum elementis noscendis,
morbi inueniri non possent ostēdet.
Ad prius horum fideli memoria ser-
uandum est, rursus tria esse præter
naturam: Morbos, vt phlegmonem,
vlcus, febrim. Symptomata, vt rubo-
rem, cavitatem, delirium: diuersa au-
tem ab ijs sunt immodica tum reten-
tio, tum excretio, & functionum vi-
tia: quæ omnia cōmuni nomine sunt
symptomata, sed nō vni generi sub-
iecta, de quibus fusius est dictum in
priori cōmentariolo. Postremo caus-
sas, velut sanguinis redundantiā vel
corruptelam. Horum siquidem om-
nium quodlibet ex eorū sunt nume-
ro, quæ esse absolute dicuntur. Actio
vero nequaquā, aut certe non simili-
ter atq; iam comprehensa: nullo et-
enim temporis momēto eius partes
sicut profecto nec sermonis, nec mo-
tus vllius manent, quinimō horum
vnusquisq; in ipso fieri esse suū obti-
net. Nam cum sit motus duplex, al-
ter in loco qui delatio, alter in quali-
tate qui alteratio dicitur, omnis ac-
tio motus est actiuus, alteratio eius

Morbus
est fact⁹,
Pathos
in fieri.

THERAPEVTICES. II

quod alteratur, est motus passiuus, patitur nanque quod alteratur: ergo affectus dum alterantur mouentur: cum à motu cessauerint, iam alterati sunt, non autem amplius alterantur. Itaq; alteratio est qualitatis generatio, quanuis absolute generatio sit ad substantiā. Verum hæc ad auscultationem physicā magis spectare videntur, sed quæ tamē quod volebamus magna ex parte explicuerint: nempe aliqua in generatione, & mutatione, & alteratiōe, & vt semel dicam in motu ipsam essentiam habere: aliqua in ipsius substantiæ constantia: vt de morbo, sanitate, symptomate, causisq; dictum est, quæ ex permanentium constantiumque numero sunt. Actiones autem, alterationesq; in quacunq; re fuerint, in ipso fieri suam possident essentiam: & corpus secundum quodcūq; morus Reī quæ uetur, secundum idem patitur, morus afficitur tūq; ei⁹ pathos siue passio dicitur. mot⁹, passio. Cæterum hæc dicta sunt vt morbos, thos voco quibus hæc paratur methodus, excutatur, ac te curare possimus. Cum his enim

b. iij.

PERIOCHE II.

non actionis vitium duntaxat euas-
nescit, sed omnia quoque simul sym-
ptomata tolluntur. Siquidem primum
& maximum actionis ipsius quæ se-
cundum naturam ædatur, omnes eges-
mus: propter illam vero & sanitatis.
sed & rursus functionis incommo-
dum amoliri cupimus, ob id vero
etiam morbum: non autem actioni
remedia, sed affectui præter naturam,
qui ei incommodat, applicamus. quare
distinguere oportet & ea quæ na-
turaliter partibus insunt, & quæ te-
mere accidunt, & quæ postremo ac-
tionis sunt causæ. alioqui affectus
vnde primo læditur actio inueniri
non potest, quem primum in cura-
tione locum obtinere diximus. Actio
autem non læditur quandiu omnia,
a quibus orta est, suam naturam tuetur.

Morborum numerum inueniri non
posse, nisi actionum causas per-
spectas habeamus.

SI vnus actionis igitur ope omnes
frui cupimus, certe eius causa in
integrali erit conseruanda: si autem ex
quadam sinistra occasione aut perijt,

aut grauiter affecta est, illius sane
caussa potius erit adimenda: quam si
quis ignorauerit, nec commoda ad-
mouebit praesidia, nec morbum vlllo
modo profligabit. Quare ad huius
causae praeter naturam cognitione,
actionis integre, causae notitia plu-
rimum adiuuabit: nam obliquum
per rectum nosci putamus, ita & ac-
tionis vitiatae causam, per eam quae
functionis inculpatae author est, fa-
cileprehendimus. quae quidem dum
male est affecta, vt pristinae integri-
tati restituatur medicum sollicitat:
atqui rudioribus lectoribus exem-
plum Galeni hic adscribere paramus.

Esto quispiam qui diu solo sit lacte
altus, vnde & cruditas in vetriculo,
& albus color sit contractus: interro-
gemusque eum qui actionum naturarum
causam non nouit, dicatque ob id cru-
ditatem esse, quod mutatus sit vetricu-
li color: nonne is protinus pristini
coloris restituere conabitur? nam
si colori actionis causam tribuit, ne-
cesse est eidem laesionem actionis im-
putet. Qui vero tenuium meatuum

b. iij.

PERIOCHE II.

actionis causam dicunt, etiam horum
omnium à modo recessum, eandem
vitiare fateantur. Tum qui tempera-
mento quatuor qualitatuum actionis
causam assignat, etiam eorundem ip-
sorum intemperiei offensam eius ad-
scribat: utique & tibi necesse erit, eo
quod secundum naturam est, prius præ-
sumpto, ita quod præter naturam est
inquirere. fieri enim non potest ut qui
id quod secundum naturam est non
norit, dignoscere id quod præter na-
turam est possit: quare denuo viden-
dum est cuius particulæ vetriculi tem-
peramento actio eius, id est, coctio tri-
buatur: quoniam non toti instrumento
veluti nec ei⁹ situi, nec magnitudini,
figuræ, aut cõtextui (quauis hæc vsum
habeant suum) primario adscribitur, er-
go vel nervis, arterijs, venis, aut de-
niq; alteri membranarum ipsum con-
stituentium: at nervi, arteriæ, venæ,
exterior deniq; membrana vsum dun-
taxat præstant: quare superest ut me-
branæ interioris temperamento actio-
nis totius organi causam referamus,
veluti in reliquis quoq; instrumentis

esse vnā particulam similem à qua
 procedit actio est à Galeno mōstras-
 tū libro de facultatibus naturalibus:
 ad quam vnā conseruandā sanā,
 aut ægram restituendam, consilium
 omne nostrū dirigere est operæpre-
 tium. Nec putandum est cum mul-
 tis, tumorem, aut scirrhon, aut phles-
 gmonen, aut abscessum, aliāque quæ
 oculis vsurpari possunt, solos esse vē-
 triculi morbos. Sunt etenim qui so-
 la ratione primo intelligantur, quos
 postea demōstrat actionis offensa: of-
 fendunt siquidem illi nunc cōnume-
 rati morbi, siue in ventre, siue in ios-
 cinore, siue in pectore, siue in quouis
 alio accidāt loco. protinus enim par-
 tem in qua sunt, ad propriā functio-
 nem ædendam imbecilliorē reddūt:
 cuius sanē imbecillitatis causa (vt vo-
 cant) coniuncta, est intemperies fri-
 gida, calida, humida, aut sicca, quæ
 cōtrarijs curaridebeat auctore Hip-
 poc. simplex quidem simplici, com-
 posita vero compositis quoq; facul-
 tatibus persanatur, nā vt octo sunt
 intemperies, ita octo erunt medena-

PERIOCHE II.

di rationes. Quocirca iam liquet ex demonstratis morborum numerum esse dignoscendum, eorundemq; differentias, si auxiliorum cōuenientiū copiae velis esse compos: quod rursum Hip. Plat. Aristotelis, Theoph. Zenonis, Chrysippi, & omnium illustriū philosophorū testimonio comprobatur: qui totidem esse medendi rationes, quot sunt morborum Idearū ratione confirmant.

Solidas partes intemperie frequenter laborare, contra Erasistratum.

Actionum naturalium causam esse se temperamentum particulę similis nuper ostensum est, vbi simul monstrabatur instrumenta varijs consistare partibus: sed ex his omnibus vnā esse, à qua præcipua obiretur actio: reliquas vero ei esse velut famulatrices, quæ tamen particularem sibi haberent actionem, vt est in oculo qui humoris Crystallini temperamenti beneficio visionem perficit: quæ læditur dum illud naturam suam egreditur: arteria autem, vena, neruūq; ei

auxilium perferunt, sed actionē quo
 que toti corpori communem habēt.
 Membranulę rursus omnes cū sint
 nutrimenti participes, omnino sunt
 facultatibus naturalibus pręditę, ac
 proinde etiam functionibus quę ab
 his proficiuntur. Quoties igitur
 CrySTALLINUS humor ex intēperie la-
 borat, omnino læditur oculorū fun-
 ctio. Cęterum non est eorum morbus
 vt organa sunt: At quod hypochy-
 ma, id est, humoris liquationem vi-
 sum impredientem vocant, nullius si-
 milariū est morbus, sed totius oculo-
 li, vt instrumenti: quod si eius venas
 aut arterias intēperies infestauerit,
 ipsarum quidem illarū morbus pri-
 mum erit: ex accidenti autem, etiam
 oculi: ac idem censendum in omni-
 bus alijs particulis. At Erasistratus Erasistra
 in tradenda phlegmone substantia ti error,
 lapsus est, cū nec in particulis phleg-
 mone laborantibus, in finibus pulsa-
 tilium impactio cernatur, nec arte-
 rię spiritum solum, cum naturaliter
 affectę sunt, cōtineāt. Nam si phleg-
 mone, aut scirrhus sit eius generis

PERIOCHE II.

morbus, cui⁹ ille opinatur, & reliquo
rū pleriq; sicut ipse obscure & mul-
ti sequaces eius clari⁹ explicare con-
nantur: vtiq; solidas ipsas partes li-
beras propemodum à morbis relin-
quit: nisi quatenus vlcerari, collidi,
incidiq; valeant, atq; id genus aliud
quidpiam pati: laborare vero eas his
octo quas diximus intemperaturis
subticuit: tanta est hominis temeri-
tas. Si enim corpora quæ ægrè affici-
untur, vt æs, ferrū, lapis, saltem cal-
fieri, frigefieri, ficcari, humescerēq;
cernūtur: vtiq; mirum erit, si duntaxat
arteria, vena, & neruus nihileius
modi sentiant. atq; hoc magis mirā-
dum, si patientur quidem, functionē
tamen legitimā edent: veluti in cor-
de facultas quidē est, qua laxatur
& contrahitur, quæ certe læditur si
viuēti animali, vt ī sacrificijs videt̃,
cor exemptum sit: quippe si non læ-
ditur, perpetuo mouebitur: nec tan-
tum ad tempus aliquod, vt nunc cer-
nitur. Manifestum est igitur lēsam
esse, proindēq; moueri desinere. Sed
cum ea facultas ledi potest, nondum

Solida
corpora
alterari,

corde exempto, colligendum huius Cauſſa a
 læſionis cauſſam eſſe intemperiem, teratorū
 cū nec figura eius, aut cavitās, oſcu pulſuū, ū
 lum, ligamētū mīve mutatum eſt, ſed tēperies.
 ſola intemperies. nam vbi ſanguis ī
 finibus arteriarum impactus actio
 nem vitiat, id arterias quatenus in
 ſtrumenta ſunt male habet: vt vero
 ſimilares particulæ ſunt, octo quidē
 ſecundum nudas qualitates intempe
 ries habent, octoq; rurfus cum flu
 xione: quare oportet eum qui horū
 cum certa ſcientia demonſtrationes
 cepiſſe velit, à libro de elementis in
 cipiāt, deinde reliquos ſigillatim re
 legat. ſunt enim huic proximi de tē
 peraturis libri, ab his de inæquali ī
 temperie, mox de facultatibus na
 turalibus, alij de animæ affectibus,
 hos excipiunt de vſu partium com
 mentarij, quos ſequūtur qui de mor
 borum & ſymptomatum differētijs
 & cauſſis ſcribuntur: nec oſcitanter
 ſunt perlegendi illi de ſimpliciū me
 dicaminum viribus libri, quos pro
 xime excipere debent hi de curandi
 ratione commentarij: quos denique

Qui ad
 hanc Me
 thodū in
 telligēdā
 ſunt libri
 prælegen
 di.

PERIOCHE II.

sequuntur ad manum libri de phar-
macorum compositione inscripti. ac
sane si eo ordine Galeni libros tra-
ctaueris, facile teipsum in vnoquoq;
morborum genere ita gesseris curan-
do, vt tandem non parum promou-
uisse intelligas.

Quid indicatio, & quantum
possit in curandi Methodo.

HIs itaq; prælibatis ad indicatio-
nem demum accedendum: si
prius in mentē reuocauero quæ am-
pliter docuit Gal. Lib. de morborū
symptomatumq; differentijs & caus-
sis. Vnum quidem esse partium simi-
larium morbum, intemperiem: qua-
tuor vero instrumentalium, quorum
Primus est in conformatione, Alter
in partiū numero, Tertius in cuiusq;
quantitate obseruatur, Quartus in
positura. Vtrarūque veropartium
tum similarium, tum instrumentalis-
um communis est ipsa vnitatis solu-
tio. ergo sex sunt in vniuersum mor-
borum genera, quorum cuiusq; diffe-
rentiæ ad vltimas vsq; species in li-
bro de morborū differentia sunt tra-

ditæ. Quare iam de medendi indicationibus est dicendum, sed hoc ipso indicationis vocabulo prius expostio. Indicatio enim est sequentium si Indicatio
 ue agendorum insinuatio, nam inue quid.
 nitur quidem & ab ipsa experientia
 id quod consequens faciendumve sit,
 cæterum non ita quasi in præcedens
 ti aliquo designatū. Proinde Empiricorū nemo dicit hoc isto indicari,
 q̄q̄ certe seq̄ hoc illud dicūt: & præcedere hoc illud: & cōsistere hoc cū
 illo: deniq; omnem artē horum observationem memoriāque esse dicunt. Nempe quid cum quo: & quid
 à quo: & quid post quid identidem sit visum. Ergo ex ipsa rei natura or
 diri, atq; ab ipsa quod sequens sit citra experientiam inuenire, id est indicatione inuenire: Sed hoc in primis adnotandum est, omnem medendi methodum per indicationem fieri: quippe quantum ab experientia Quid me
 feiunctum est, id totum indicatione no thodū cōminatur. Quare quisquis cōdere me dituro ne
 dēdi Methodum ad vnguem parat, cessariū huic est à primis indicationibus au est.

PERIOCHE II.

spicandum: atq; hinc ad eas quæ des-
inceps sunt transeundum, rursûmq;
ab his ad proximas. Itaque pergenti
prius desistendum non est, quàm ip-
Finis huius compos sit finis. Porro finis pro-
ius insti- positæ, nûc nobis tractationis, est in-
tuti. uenire cuiusque morbi remedia: ad
quod sane consequendum nobis est
necessaria ipsi⁹ morbi cognitio, qua-
lis scilicet natura sit, vt prius est ostē-
sum: quippe quando is sit qui curas-
tur merito ab ipso indicationem in-
cipere oportet: quocirca primû que
generalis communisque morborum
indicatio sit, inuestigandum est: ab
hac deinde ad alias speciatim descē-
dendum.

Morbum omnem, vnum spe-
cie esse, multitudine autem
diuersum.

MOrbos omnes vnus eiusdē-
que participatione sic appella-
ri necessum esse vna hæc demonstrat
ratio, qua homines vnus & eiusdē
participatione homines appellari di-
cimus. Canes etiā (non admissa æ-
quiocatione) boues, alia denique

omnia quę specifica appellatione ita nominamus, non alia ratione sic dicuntur quàm quod illis species quędam & proprietas, quę omnibus eiusdem rationis, non autem alijs, insit. Nam hominis cum homine, veluti Theonis cum Themisone non nominis modo, verum etiam eorum quę ijs insunt, proprietas est: animalia enim & bipedes, & rationales, & mortales sunt. Quare hoc theorema colligere licet: Nihil vlli singularem eiusdē speciei, quā illius quidem est speciei, inesse deprehenditur, quod non etiam reliquis eiusdē participationis insit: vt omni cani terrestri, eadem quā canis est natura insit: qui quanuis nomine cū cane marino non differat, species tamen quę omnia proprie distinguntur longe alia est ab eo. Sed id in substantijs mirum videri nō debet, quum & id accidētibus adesse conspiciatur: homo enim ambulans ab homine ambulante non differt secundum ipsam inambulationem, sed nec vltus ab vltro, nec albus ab albo. Ita igitur &

c.j.

PERIOCHE II.

Platonis
axioma.

Quæ solo
accidente
differunt
ea solo nu-
mero dif-
ferunt.

ipsum ægrotare & valere se habent:
illud enim ægrotantibus omnibus in-
est, hoc valentibus: utique vnum idem-
que utrumque. & veluti nomine ho-
minis vnum, ita etiam nomine sanis-
tatis vnum significatur. unde quam
sint stupidi qui vnum esse phrenitis
cum & vnum Empiricum, vnum ta-
men hominem esse non concedunt,
colligere promptum est: quibus pa-
rum certe perspectum est Platonis
axioma, quo vnum esse plura, & plu-
ra quoque esse vnum contendit. Unde
vnum genere, specie, ac numero
dici ac esse qui non intelligunt, mi-
hi, per Iouem, asino (quo nullum est
animal stupidius) ineptiores viden-
tur. nam hic communium specierum
vnam, alteram priuatarum cogni-
tionem habet, ut qui camelum, &
hanc camelum, hominem rursum, &
hunc hominem curatorem suum, vi-
am preterea communem, & hanc cui
insuevit cognoscat. Quare si com-
mune illud unde homines specie sunt
vnus, intelligit asinus, certe flagitios-
sum erit morbos omnes vnus eius

démque participatione morbos nō
esse appellandos, putare.

Morbum rursus vnum gene-
re esse, ac eum ipsum quip-
piam esse.

CUm totius essentię quędam sint
accidentia, vt albedo, obesitas,
inambulatio: quędam vero partium
eius, vt cęcitas oculorum, claudica-
tio pedum: pręterea animi quędam
signa, vt bonitas, iustitia, fortitudo:
certe morbum quędam esse qui no-
tione vniuersali genere aut specie
vnum sit, vnde reliqui morbi sic ap-
pellari debeant: ac denique vt illa
corporibus accidant, non abs re in-
genue profitentur. Medicus enim
ideo sic appellatur, quod habeat id
quo cęteri vocantur medici: ita &
quis ægrotare dicitur, quia id com-
mune perferat, vnde rursus omnes
sic laborare creduntur. Quo fit vt
mihi mirari subeat de his qui phre-
niticum & hominem esse concedūt,
morbum vero & animal esse nequa-
quam. Quippe quod perinde est ac Simile.
si composita esse des, de simplicibus

C.ij.

PERIOCHE II.

autem dubites: quasi priora compositis simplicia, natura non sint. Prius enim est natura homines esse, & Phrenitida, quam hominem Phreniticum. Sed maiorem dementiam audi quorundam negantium ideo morbum esse, quod is per se nunquam fuisset. Pulchre quidem dictum, nam qui fieri potest ut albedo, cursus, aut aliquod denique accidens per se, non autem in alio consistat? Nonne sensus vnum quid est, quod ipsis corporibus accidit, corpus autem sentiens vnum sita hercle morbus accidit corporibus, quæ hinc ægrotare dicuntur: quare absurdum est morbum aliquid esse negare. Quippe si affectus nihil sit, utique & morbus nihil erit: sin affectus aliquid esse detur, utique & morbus aliquid fuerit. Ac mihi quoque de symptomate, & passione, intelligendum volo, præterea de sanitate, & paritate, & robore, & potentia, omnibusque alijs quorum & nomina, & notiones de rebus quibusdam subiectis sunt dicta. Omnia namque hæc corporibus insunt partim ut af-

THERAPEVTICES. 19

fectus, partim vt actiões, partim vt
passiones: quorum quædam naturali
ter, quædam præter naturam insunt.
Verum ne hæc nostra perioche latius
extendatur, vela contraham, quibus
vnâ complicabo morbum vnū Enumera
ratio.
esse ex his quæ præter naturam dis
cuntur, quem à pathemate solo mos
tu differre ostendimus: ac simul ad
debamus neminem morborum num
merum habere posse, nisi prius in
telligeretur tēperamētum esse causā
sā omnium actionum naturalium,
quæ omnino integre fiunt dum na
turaliter est affectum: si vero contra
naturam, vitiosæ corruptæq; ædun
tur. Vnde contra Erasistratum pa
lam esse confirmamus, solida cor
pora nō solum phlegmone, scirrho,
tumorēve lædi, sed frequētius ac po
tius eorum actiones ab intemperie
offendi: ad quorum certe omnium
curationem, indicationib⁹ esse opus
res edocebat: ac ita demū quid ipso
indicationis nomine significaretur,
& quātū hæc ipsa posset in arte me
dica, arctius perstrinximus. Cui pos
c. iij.

PERIOCHE III.

tremo disputationi successit demon-
stratio, qua morbum vnum esse ge-
nere, numero autem diuersum inter
iectis Logices theorematibus nō pau-
cis longa dictione Galenus confir-
mauit.

Finis secundæ Perioches.

PERIOCHE TERTII COM-
mentarij Therapeutices Galeni.

Vnde in morbis curandis præci-
pue sumitur indicatio.

QVoniam iam monstratum
est indicationem, quæ ab
ipsa rei natura primū ori-
tur, quid sit agendū
inuenire: necessum est præsidiorum
inuentionem ex morborū natura su-
mi. non tamē ea quæ à morbo capi-
tur indicatio, (quāuis omnium pri-
ma maximāq; sit ad curationē) sus-
ficat (quod putauit Thessalus) quin-
imo & corporis totius, partisq; tem-
peries, victus ratio, ætas, consuetudo

In cura-
tione ob-
seruāda.

do, tēpus, ac deniq; omnia quæ scribit Hippo. diligenter sunt obseruanda. Illa enim quā primum diximus quæ præter naturam sunt in corpore, vt est calculus in vesica, auferenda: quæ autem secundum naturā habent, conseruanda esse indicat: quæ vero locum exilierunt, vt intestinū in scroto, reponenda in locum pristinum sese insinuant. Sed id profecto commune est etiam idiotis, qui verrucas, pterygias, tumoresq; præter naturam omnes sibi auferri, membrum vero luxatum sibi reponi iubent. Quibus autem præsidij id fiat solus nouit, qui & ratione, & experientia finem artis consequitur. Quocirca vnitatis solutio (quæ in diuersis partibus diuersa sibi sortitur nomina) vnitionem postulat: verum nō intelligunt omnes, quænam particula id recipit aut refugit, cuius tamen rei duplex est cognitio: altera Quæ in ra per experientiam, cui longo opus partis vni est vsu: altera per ipsius partis naturam, quam certe docet eius nervosa, gnoscent carnea, aut ossea substantia. præterea da.

c. iij.

PERIOCHE III.

actio, situs, & utilitas non parum ad id cōferunt: à quibus certe quis exorsus, non modo quānam sanitatem recipere possint intelliget, sed quibus auxilijs id commodè fiat, optimè cognouerit. Rem itaq; de vlcere simplici, & nōnunq̃ orationis ductu, composito aggrediamur: exemplū de cauo vlcere, in quo est generāda caro proponentes, vt simul & Thesalum confutemus, & rationalē auditorem in arte perficiamus.

De vlcere simplici, & cauo, ad quod omne medicamē Sarcoticū indiscriminatim vsurpat empiricus.

VLcus igitur simplex esse (quod claritatis gratia posthac vuln⁹ appellabimus) aut cōpositū ex multis alijs affectibus, cavitāte, putredīne, phlegmone, partis intemperatura, alijsque de quibus mox dicemus, omnes nouerūt: de quibus hoc tertio, quarto, quinto, ac sexto libro cū Galeno docebimus, exordium facientes in hoc, & quinto à simplicib⁹: nam quæ sūt manifestiora prius tractari debent, quāuis etiam nemo cō

THERAPEVTICES. 27

positorū rationē intelligat qui simp-
 plicia prius omnia perspecta nō ha-
 beat. Vulnus itaq; vt iam est dictū,
 solam vnitionem, cui si accesserit ca-
 uitas impletionem, ac tandem cicat-
 tricis obductionē indicat: cavitās au-
 tem si os subditum carni perierit,
 nunq̃ ad vnguē repleri, cicatrice ve-
 ro obduci potest: quod & ratione, &
 experimento solum cōprehenditur.
 Quæ caua replent Sarcotica dicun-
 tur, à Thessalo frequenter vsurpata:
 quorū tamen inuentionē nec vt do-
 gmaticus, nec vt empiric⁹ nouit. ea
 autem sunt, Iris, panax, thus, aristol-
 lochia, erui farina, ac ex his cōposi-
 ta nō pauca à Galeno libris de Phar-
 macorum mixtione tradita, ex qui-
 bus vnum tibi deprompsim⁹, quod
 libro quinto *διὰ τοσιλφία* vocauit: ac
 illud in communem praxim ducen-
 tium formulam parauimus, vti sane
 & facturi sum⁹ vbi opportuna sese
 obtulerit occasio. habet enim in hūc
 modum: &. resinæ vnciam semis, Sarcotica
 pumicis torrefacti & cum vino re-
 stincti, ireos, aristolochiæ longæ, sine

PERIOCHE. III.

gulorū drachmas duas semis, aſe fœtidæ drachmas quinque, ſquamæ æris, thuris, ana drachmā vnā ſemis. Fiat puluis qui in mel coctum excipia-
tur ad vſum. Omnia ſiquidem ſiue ſimplicia, ſiue compoſita Sarcotica, ſi commode admoueantur, ſemper effectum conſequētur. Sed ideo fre-
quenter ſine ſuo fruſtrantur, quòd empiricus omnib⁹ indiscriminatim naturis citra delectum ea applicat: verum rationalis medicus qui ſin-
gulis naturis ſua eſſe remedia cogno- ſcit, vt poſtea mōſtrabimus, vni ari- ſtoloſchiam intelligit vtilem eſſe, al-
teri autem nocuam: idque ob diuer- ſa hominū temperamēta. Quocirca ſæpenumero quæ vlceri aduerſa eſſe videt, frequēter ſimul temperat: ita demum ex contrarijs vnum facit ap-
ptiſſimum. quod nō intelligens em- piricus iubet multa eiꝰdē facultas- tis miſceri, vt ex illis aliquod ſit for- ſan quod rem ſuam adiutare poſſit. Quare nec æruginem, nec oleum ſi- mul miſcuerit. quod rationalis intre- pide fecerit, non ignarus, ex duob⁹

immodicis cōtrarijs vnū effici mos Ratio cō
dicū: quòd Gale. libris de pharma ponendo
eorum mixtura docuit, ac qualis cu rum me
iusq; modus in cōpositione esse de dicami
beat luculenter monstrauit. num.

Carnis generādæ caussa duplex,
cui inferuit sarcoticum medi
camentum detergens & siccās
circitèr ordine primo.

PORRò quoniā in cauo vlcere car
nis quæ periit generatio propo
nitur, materiam ad id esse sanguinē
probum, opificem vero authorēmq;
partis vlceraatæ naturam seu tempe
riem est intelligendum. Quare hæc
duo cōsiderāda sunt semper, & quod
subiectum est iusta ne sit temperie,
præterea sanguis qui influit, bonus
ne an modicus sit. Quibus sic habē
tibus nihil est quod obstat quo mi
nus prima carnis generatio feliciter
contingat, idq; nullius externi me
dicaminis ope. Verum quoniam om
nem qualitatis alimentorum muta
tionem duplex excrementum sequi
tur, necessum est in carne generanda
geminum quoque prouenire: alterū

PERIOCHE III.

crassum ac viscosum, quod sordes dicitur: alterū vero tenue & aquosum, saniem appellamus: illud detergeri, hoc vero resiccare postulat. Quare cum nullo tēpore natura cesset, semper hæc ambo excrementa in vlcere cauogignētur, vnde & perpetuo erit opus vtroq; medicamentorum genere, vtique & quod siccet, & quod expurget: quorū materiam habes amplissime libris de simpliciu medicamentorum viribus, vbi & per genera & species docuit Galenus quædā calfacere quædam refrigerare, humectare aut siccare: atq; frequenter simul coniūcta esse, certis tamen limitibus, ceu gradibus id facere caput vltimum quinti libri illius tractationis satis fecerit. Quoniā vero medicamenta valenter tum siccantia, tum detergentia non modo humoris influentis redundantiam consumunt, sed etiam affluentem sanguinem populatur, operæpretium est ea ipsa esse primi (aut circiter) ordinis siccantia ac detergentia: qualia sunt, thus, & hordeacea, fabacea, eruiq; farina,

iris, aristolochia, cadmia, phu, tutia,
pompholyx, myrrha, aloë, ac pluri-
ma denique, sola maioris minorisq;
ratione dissidētia. vnde fit vt eorum
nonnulla huic naturæ apta, huic ve-
ro aduersa esse conspiciantur.

Seruandam esse partis tempe-
riem, vlcus tamē semper sic-
candum, quantitatem postres-
mo in curatione intelligi aut
præcipi non posse.

CArnem in vlcere cauo producē-
dam similem esse debere ei quæ
præfuit, rei natura indicat. vnde & ge-
mina nobis exoritur indicatio: alte-
ra ab vlcere quod siccarī semper, al-
tera à partis temperie quæ cōserua-
ri postulat. nam quæ præter naturā
sunt, ablationem: quæ vero secūdum
naturam, sui cōseruationem indi-
cant. Quare particula humidior, hu- Theore-
midius medicamentum: siccior, sic- ma.
cius, ac ita in reliquis desiderat: quo
fit vt sua cuique naturæ sit medendi
ratio. merito itaq; thus in quibsdā
naturis ac vlceribus pus mouet, car-
nem non producit: aristolochia & pa-

PERIOCHE III.

nax valentius ficcant quàm pro naturis humidioribus sit ex usu, & ita demum in reliquis, quorum enumerationem non patitur hæc nostra Latronica perioche. Verum in ijs omnibus examinandis empirici methodicum vincunt, cui ad omne vlcus cauum vnum sufficit medicamentum: sed illi longa obseruatione cognouerunt, non omnia omnibus conuenire, quare quoad licet ad curandæ naturæ proprietatē quamproxime accedunt in suis commentarijs ita scribētes: Medicamētū ad eos qui molli sunt corpore, & pueros, & mulieres. rursus aliud emplastrum ad senilia corpora, aliud ad ea quæ cicatricem ægre admittunt vlcera, orasque prætumidas habentia, componunt: non tamen fatentur veluti nec dogmatici omnes, naturā ad vnguē cognosci posse, quare nulla scribi potest exacta curatio. Quāuis enim in arte nec res, nec medela, est quæ specie dicibilis nō sit: vna tamē est quantitas quæ nec scribi, nec præcipi potest. In vlceribus enim & sordes & fa

nies dicitur, horum tamen quātitas minime. quāquam proxime ad eam accedere studētes, paucam, multam, crassam, tenuē mve dicimus. ad id autem coniectura non modice iuuabit, nam videntibus nobis medicamentum carnem non produxisse, considerāda hæc duo sunt, an parcius, an nimium medicamentum siccauit: horūmq; notas habebimus sordem & faniem: nam si plusculū sordis ac fani ei fuerit, parcius: si vero squallidū & exuccum reddatur vulnus, supra modum siccauit. Statim igitur mensuram quoq; excessus defectūque ex ipso notarū modo intelligemus, tantūq; pharmacum quod deinceps parabitur, vel siccus, vel non tale ad mouebimus.

Exēplū.

De simplici vlcere curando.

Perficitur vulneris curatio iuxta eādem methodum: quippe quæ tum à laborantis partistēperie, tū à medicamentorū facultate accipitur, quæ ambo à tractatione de elementis pendent. In hoc enim vulnere sola est soluta vnio, quæ agglutinans

PERIOCHE III.

Quarecu
tis repara
ri non po
test.

tia medicamēta poscit: non vt in vl
cere cauo, aut plano. in illo enim ge
neranda est caro & cutis, tum postea
ea vniēda est solutio: in hoc vero duo
duntaxat proponūtur, cutis superior
ris (quam epidermida Græci vocāt)
generatio (nam prima reparari non
potest, pars est enim ex semine con
tracta) ac vnitatis solutæ coitio. In
vulnere autem vnus est tantum scop
pus, vnitio: de quo nunc propositum
nobis est. ad quod sane faciundū dis
ductorum oras vnā coniunctas esse,
coniunctasque remanere oportet, si
mul autem manent quædam per se,
quædam aliorum ope. per se quidē,
quæcūq; secum concresecunt ac coas
lescunt, vti caro ipsa, & quæcūq; car
neam habent constitutionem. Alio
rum vero ope sic manēt dura siccaq;
(nam mollia facile coalescunt) qualia
sunt ossa, nerui, cartilagines quæ glu
tinum aliquod, aut vinculū vt simul
commissa maneāt, requirunt: sed de
ijs postea. Nūc vero de ijs quæ facile
per se vniūtur, in quibus natura caus
sa est coitionis. vnde si quæ dissidēt,

in idem ad amissim componas, citra
 alienam opem glutinabuntur. Com-
 ponuntur quidē aut vinculo circums-
 ducto, aut fibulis, futurave adiecta.
 quod circumijcitur, in duritie & mol-
 litie mediocritatem seruet oportet.
 hæc si feceris, fueritq; vt est propo-
 situm simplex vulnus citra omnem al-
 lium affectum, proculdubio coibit: si
 vero præ eius magnitudine ad imum
 vsq; disunctæ partes coniungi non
 possint, nec fibulis, nec futuris ad eas
 pertingere valentibus, vel etiam iam
 sanies sit illic collecta, vel dolor quis-
 piam adiunctus, eiusmodi vlcus ex so-
 la partium commissione, omnino ag-
 glutinari non potest. dolor enim flu-
 xionē citat, quam ferre non possunt
 particulæ ex dolore imbecilliores fa-
 ctæ: sanies vero, aut inclusus aer in-
 teriorum laterum frontes sese cōtin-
 gere prohibet. Quare illæ saltem vl-
 ceris partes, vt coeant, etiam carne
 prius impleri naturæ opera postulāt:
 eritq; parādum sarcoticum medica-
 men, quod vlcus siccet, saniem vero
 si iam subsit, consumat, ac quæ influ-
 d. j.

Sarcotici xura sunt, prohibeat. Diffidet tamen
ac glutin à glutinatorio, quòd illud siccet de
natorij tergatq; hoc vero siccet quoq; sed
medica valētius, & adstringat: qualia sunt au
mēti dif stera acerbāq; omnia. Sarcoticum au
ferentia. tem non debere esse adstringēs, hæc
ratio commonstrat, quòd sordem vl
ceribus arctius affigeret, quàm quæ

Vinū vul facile absolui possit. Vinū igitur om
nerib⁹ o nis vlceris quā vlcus est, optimū est
ptimum medicamētum. Vnum tamen in hac
medica vnitione vulneris pariter est obseruā
mentum. dum, vt videlicet partis tēperies con
seruetur. nam sicca, sicciora: humida,
humidiora quoq; postulat glutinato
ria pharmaca. Hinc alia quædā me
thodus succedit ad eorum præpara
tionem compositionemq; pertinens:
liquidē vlceribus profundis non fa
cile adponitur pharmacum siccum,
quapropter ipsum miscere liquidis,
aut pinguibus vt in emplastrorū for
mam reducantur oportet, quo tan
dem ea fluentia in profundum facio
lius perreptent. Verum hæc ad spe
culationem de pharmacorū compo
sitione pertinere videntur. Hæc igi

tur de glutinatorijs medicamētis stri-
ctim summatimq; diximus.

De inducenda cicatrice.

PAulo antè orationis sequela de vl-
cere cauo differētes, sumus quidē
piam breuiter locuti de cicatrice in-
ducenda, quam rem hic sumus abso-
luturi. In hoc enim caro materiei ra-
tionem obtinet, vt in cauitate replē-
da sanguis: medicamentum vero va-
lentius quā glutinatorium siccans,
efficiētis causæ officio fungitur. nam
cum æquale est vlcus, oportet carnē
naturali tegmine operire (id enim est
ad cicatricē ducere) quare nobis est
generanda cutis, aut sūma caro simi-
lis cuti faciēda. Atqui cutis, vt prius
est dictū, regenerari non potest: qua-
re quidpiā quod sit ei simile, & quod
eius officiū suppleat, est emoliēdum.
Alteranda igitur est caro ad siccita-
tem, cutis tamē hæc nil est quā ca-
ro siccior facta, vnde & ea ipsa cutis
dēsior sicciorq; esse debet: quod pla-
ne effecerit medicamentū & siccans
& adstringens, quale erat glutinatio-
rium. Sed eò dissident, quòd epuloti-
d. ij.

PERIOCHE III.

cum, id est, cicatricem inducens non modo qui influit humorem, sed eum quoque qui in carne continetur consumere debet: glutinatorium vero solum quod confluit insumat oportet, quo videlicet particula vacuis superfluisque vacet. Quocirca hæc minus, illa magis siccare iam dictione clarum est. Veluti hæc modice siccant, Galla, balauistiū, acacia, rhus seu sumach: Chalcites vero, æsustum, æris squama, misy, & fissum alumen multo his sunt valentiora, quæ lota vim illam magna ex parte remittunt. adhæc ex libro sexto de pharmacorum miscella huc vnum compositum transtulimus, quod aridum, ut reliquos pulveres, appellavit Galenus. & corticis pini siccati drachmas sex, cornu cerui ambusti, cerussæ, corticis thuris, ana vnciam semis cadmiæ vnciam vnā, æruginis rasæ drachmā vnā semis: ijs contritis utitur. Alterum cicatrice obducens carnes citra erosionē, ex Harpocrate in hunc modum ibidem describit Galenus. & sandaracæ, chrysocolle, arsenici, pares singulorum por

Epulotium.

Alterum

tiones: fiat puluis, qui (si voles) oleo aut cera excipiatur ad vsum. Sed de ijs haftenus. hæc enim ad cōtemplationem de cōponendis medicamentis referri debēt, quæ sane hos cōmētarios ordine sequitur, vt hos simplicium medicaminū antecedere cognitionem, quam rursus de temperamenti & elementis disputationem præcedere optima ratione putamus. Nam cum altera sit de simplicibus peritiā, altera de compositis, æquum est profecto, vt simplicium cognitio composita ordine antecedit. Verum hic finem capiat de cicatrice inducenda nostra disceptatio.

De carnis immodica excreſcētia.

DVm vlcus carne superexcreſcente luxuriat, duplex, vt in cauo, proponitur affectus: instrumentarius, nempe magnitudo, & cōmunis, quæ solutam vnitionē appellauimus: hic coniūctionem, ille vero ablationem sui indicat. naturæ quidem opera caro generabatur, excreſcens autē medicaminis vi tollitur, quod valenter siccet, tum insigniter detergentibus,
d. iij.

PERIOCHE III.

tum epuloticis proximum sit oportet. At mihi vnū semper fideli memoria obseruari in omnibus cupio, nempe pro diuersis partium temperamentis variāda esse remedia: quū nonnullis naturis quædam carnem excrescentem insumūt, alijs vero cicatricem inducūt. vt quibusdam solum glutinatorij munus præstāt. nā sicca particula sicciora: vt humida humentiora, ac in reliquis postulat remedia. ad id autem benefacit calx viua, arsenicū, ærugo, æris squama, chalcāthum, vtraq; aristolochia. ex compositis vero hoc vnum ex Scribonio Largo traduxim⁹ quo Meges

**Carnē luxuriātem insumens phar-
macū ex Scribonio Largo.** chirurgus utebatur. ℞. calcis viuæ vncias duas, thuris, squamæ æris ex clauis decussæ, ana vnciā vnam, adde si voles æruginis & argēti spumæ, ana drachmas duas: excipiantur in oleo myrtillorum ad vsum. Præterea ex Galeno libro quinto de compositione pharmacorū sic habeto. ℞. Sādarachæ, arsenici, ana drachmas tres, calcis viuæ, thuris, ana vnciam semis: ijs tritis vtitor. Alterum vi-

ride à Galeno appellatum cuius me-
minit libris methodi, in hunc mo-
dum habet. ℞. æruginis, chrysocolle,
ana vnciam vnam, terebinthinæ vn-
ciam vnā semis, ceræ vnciā semis, as-
ceti modicum. Multo plura certe ex
Largo, Galeno, Principe, cæterisque
praxiforis trāfferremus, sed vereor
ne hæc nostra perioche compendij
nomen exueret. Quare cum iam de
simplicis, caui, pleni, luxuriantisque
vulceris curatione absolūimus, affe-
ctus qui simul frequenter vulceri ad-
sunt misceamus, exordium faciētes
ab intemperie partium quæ solutio-
ne laborant.

De affectibus solutæ vnitio-
nis permixtis.

Iam res ipsa suadet vt vulceri affe-
ctus qui simul crebro incidere so-
lent, ab ipsius partis intemperie ex-
orsi misceam⁹. ea enim aut calidior
aut iusto frigidior effecta utiq; exi-
git medicamētū quod nō modo sic-
cet aut humectet, sed quod propor-
tione affectui respondeat. fieri enim
nō potest, vt in vulcere vel carnis pro-

d.iiij.

PERIOCHE III.

ductio, vel sinus impletio, vel agglut-
 inatio, vel deniq; cicatricis inductio
 recte vnquā cedat, nisi subiecta caro
 pro naturali modo se habeat. Quo-
 circa maior tibi sollicitudo erit legi-
 timi vlceratarum partium tempera-
 mēti, quoties eas carne implere, vel
 cicatrice obducere, vel glutinare stu-
 des. Nam si vnā cū vlcere phlegmo-
 ne esset, hæc opera naturæ fieri non
 possent, nisi prius & phlegmone, &
 partis intēperies (dum adest) sit dis-
 scussa. Animaduertendū subinde est
 medicamenta tum calida tum frigi-
 da certo quodā ordine in partiū in-
 temperie corrigenda contineri de-
 bere. nam mādragora seu altercum
 nimis refrigerant, resina vero, pix,
 asphaltus, calidiora sunt, quibus sicci-
 tate nō sint immodica. Proportione
 autē in curandis vlcerib⁹ habeāt se
 oportet aeris ambiētis tēperamēta,
 quorū excessui medicamētū occur-
 rat. Ideoq; Hippocrates in calidioris
 bus anni temporibus ijs quibus fas-
 cultas sit frigidior vtitur medica-
 mentis : calidioribus per frigidiora

semper. itaq; hoc verum erit theorema, vnumquodq; sui conseruationē Theorema per similia, ablationem vero per contraria habere. Ad hæc quod tū corporis temperies, tum anni tempora, tum partium naturæ consideranda sint ab eo qui probe vlceris persanare conatur.

In curatione tum vlceris tum aliorum affectuum sæpe indicari contraria, incipiendūmq; esse ab eo, sine quo alterū curari nō potest.

Contrarias subinde in vna curatione indicationes oboriri ex ijs quæ latius postea explicabuntur facile intelligetur. hic quoq; breuiter, quantum sit ex usu, dicetur. etenim corpus interdum est humidius, pars vero siccior, aut contrā. Pari modo in calore & frigore frequenter reperitur. In qua re eatenus vires medicamēti intendere oportet, quatenus corpus ad naturalem temperiē verum est. Pone igitur totum laborantis corporis temperamētū esse duobus numeris humidum, partes vero laborantes siccas eodem ordine: cer-

PERIOCHE III.

tè medicamētum in hac oppositio-
ne mediū esse debet. Sin siccior iusto
particula, q̄ corp⁹ humidius fuerit:
vtiq; in tantum siccitatem medica-
menti intendi conueniet, quantum
particulæ temperamentū totius cor-
poris temperiem excedit. veluti si
quatuor numeris sit pars exulcerata
medio temperamento siccior, ægri
verò natura gradibus tribus humi-
dior, clarū est oportere medicamē-
tum vno gradu siccum esse, quoniā
particulæ siccitas vno duntaxat or-
dine corporis humiditatem supera-
bat. Sed vt hæc coniectura sola co-
gnosci possunt, ita longam exercita-
tionem postulant. Nec est præterea
quod de indicationibus à calido fri-
gidóq; sumptis dicatur, quandoqui-
dem ad portionem dictorum intel-
ligi possunt. hæc siquidem indicatio-
nes eodem tempore fiunt. Sed aliæ
sunt quæ diuersis tēporibus p̄ficiū-
Ordine se tur. Phlegmone enim primo auferri
se habend⁹ debet, sordes postea detergeri, caui-
tia in cūstas dum adest implenda, postremo
randis vlcicatrix inducenda. Ergo in omnib⁹
ceribus.

sic mixtis vlcerib⁹ triplex nobis p^o Triplex fi
 ponitur finis: Vnus sumptus à caus^{is} nis in vl
 fis illius quod postea futurū est, ve^o cerum cu
 luti est iusta subiectæ carnis tempe^o ratione.
 ries, quæ caus^a est impletiōis & coi
 tionis. Secundus finis, vt quod ratio
 nem obtinet sine qua non, quemada
 modum est vlceris puritas & caui
 tatis impletio: nam sine harū vtra^o
 que vlcus non sanabitur. Tertius est
 eorum quæ velut nos vrgent ac so
 llicitāt, vti sunt affectus vnde primū
 maximēq³ homini imminet pericu
 lū, qui primi curari debebūt, ac ītero
 dū soli: quemadmodū cū ē vena aut
 arteria sanguis immodice fluit, totū
 per transuersum vas præscindes, vt
 quod ex eo sanguinis profluuio peri
 culum imminet, auferas: vlcus tamē
 insanabile reddes. Præterea vbi lu
 xatio cum vlcere adest, ipsa quidem
 curari non debet, quoniā si ea in ma
 ioribus sit articulis, dum curatur, cō
 uulsiones, deliria, grauissimāq³ inue
 hit symptomata, vlcus tamen sanari
 possit. dicetur vero de his amplius
 in sequētibus, in præsentia nanq³ ad

PERIOCHE III.

proprias vlcerum differentias redire placet, ac propositum sermonem breuiter complecti, ne quicquā prætermittamus, quod ad curandi artē desideretur.

De Vlcerum simplicium & compositorum proprijs differentijs, quæ curando suā indicationem habent.

PROPRIAS vlcerum differentias curationem indicare paulo post ostendetur. Alia est enī simplicis, alia vero eius cui alius est adiunctus affectus differentia. Simplicis rursus quædā ab ipsius rei natura ducitur, vt est obliquum, rectum, magnū, paruum, profundum, altum: quædā præterea extrinsecus accedit & rationē habet sine quo non, vt à tempore: recens, vetus, latens, prominens. Alia etiā à loco sumitur in quo consistit, vt dum musculi caput, finis aut mediū, venter etiam aut iecur est vlceratum. Verum hæc differentia nō à propria vlcerum natura, sed à locis in quibus hæc sunt desumitur. Quare ab ijs etiam curandi capitur indi-

catio, non tamen ex æquo: nam vet⁹
 aut recens nil indicare mōstrabitur
 in quinta perioche aduersus Thessa
 lum. siquidem quod vulnus tantum
 est (de quo nobis maxime hic agi^t)
 ipsam duntaxat vel vnitionem, vel
 agglutinationem, coitionem, vel des
 nique continuationem desiderat. vn
 decerte clarum est ipsum siue recēs,
 siue vetus, similem omnino optare
 curationē, nil plane indicante discris
 mine eo, quod à tempore sumitur.
 Cautas autem in curatione conside Quid in
 randa est, vtrum ea in superiore par cauo vlce
 te sit, ita vt sanies ex ea prona defluere curan
 at: an in inferiore, ita vt illic sistatur. do aduer
 ei⁹ enim cui patet effluxus, eadē quē tendum.
 aliorum est curatio: cui vero non pa
 tet, aut cautas tota secanda, aut in
 fundo tantum aperienda est particu
 la. quando vero alterutra sit ineun
 da, docebit tum locorum ipsa natu
 ra, tum etiam vlceris magnitudo. Si
 enim locus dubiam faciat sectionē,
 & vlcus magnum fuerit, in profun
 do magis aperire expedit: sin contra
 se habeāt, perscindere lōge præstat.

PERIOCHÆ III.

Deligatio vero ei⁹ incipiat quidem
 superne, finiatur infra, vbi scilicet pa-
 tet effluxus. Porro vlcera proprias
 differentias absolvere par est, ac
 mōstrare quid in curādi ratione pos-
 sint. Transuersa enim vulnera, quia
 curatiōe labra habent multum dissidentia, cō-
 possint p iungi diligētius postulant. lōga mus-
 priæ vlce culorū vlcera, si à duplici initio deli-
 rum disse ges, nec fibulis, nec futuris tibi opus.
 rentiæ. erit. magnorū vero & paruorū cura-
 tio iam potestate est tradita. Quæ ve-
 ro profūda latāq; sunt, & valēter sic-
 cari debēt: & ne immature labra cō-
 iungas, & vt à duobus initijs deli-
 ges, & vt altis deniq; futuris confus-
 as oportet. Ad eundem modum, &
 si multæ differentiæ simul coierint,
 quarū sua cuiq; sit indicatio: si qui-
 dem inter se minime pugnent, om-
 nibus vti maxime expedit: sin alia
 quatenus secū pugnent, habenda est
 ratio eius quæ potentia ac dignitate
 vincit, vti postea fusiū docebitur.

De vlce Superest tamen vt quippiam de vl-
 rib⁹ aliū ceribus quibus alius adiungitur affe-
 ctum. Etus breuiter dicam⁹. qui enī phleg-

monen, erysipelas, gangrenam, aut secum ha
 aliū quenuis affectū, differētias vlc̃ bentib⁹.
 cerum esse putat, longe quidem falli
 tur, quod vnica hac demonstratione
 omnibus innotescit. Habet enim in
 hunc modum: Quod consistere seor
 sum & per se potest, id nullius vn⁹
 quam alterius fuerit differentia, sed
 quod alteri accidit nec seorsum per
 se cōsistit. Atqui phlegmone, erysi
 pelas, gangrena, putredo, seorsum &
 per se consistere possunt, nec alij ne
 cessario accidunt. Omnib⁹ vero vlc̃
 ceribus necessario euenit vt sint vel
 parua vel magna, æquabilia vel inæ
 quabilia, recentia deniq; aut inuete
 rata, quas proprias esse vlc̃cerum sim
 plicium differentias paulo antè di
 ctū est. Alio rursus modo vlcus cru
 cians & vlcus sordidum, ceu quædā
 vlc̃eris differentia dicuntur. Cæterū
 compositum quoque quippiam hic
 indicatur, sed aliter quā cū dicitur
 vlcus cum phlegmone: quippe hic
 phlegmone est affectus, illic dolor &
 sordes ex genere symptomatum di
 cūtur. Pari modo & cum dicitur ca

PERIOCHE III.

cochymum vlcus, aut fluxione vexatum, aut arrosū, caussa cum affectu copulatur. Verum finiēda hoc loco nostra perioche videtur. Quādoquidē quæ sequitur disputatio ex quarto Galeni Therapeutices commētario hanc rem multo fusi⁹ tractabit. Hac enim complexione præcipuus fuerat scopus de vlcere simplici ac eius curatione, simulque rei vicinio vlcēis caui sanationem per sarcotica quæ tum detergent tū siccant citè ordine primo fieri vt caro tandem gigneretur: cuius materiā sanguinem, effectricē vero causam naturā esse monstratum est. Quare colligendum fuit seruandam esse partis temperiem, vlcus autē siccandū. Quāuis rei quātitatem percipere admodum difficile sit. vnde sæpe cōtrarias oboriri indicationes, quas facile intelligat qui in hac Methodo aliquantisper sit versatus, ostensum est. Postremo seorsum curationē simpliciū vlcērū tradidimus, ac de cicatrice obducenda, carnisq; luxuriātis consumptione: cui demū de vlcēri cōmixtis

affectibus compendiarium doctrinā
addidimus. eam autē de simplicium
compositorumq; vlcere proprijs
differentijs huius perioches finis ex
cepit. quem sane lubēs accelerassem,
verum consulto factum putauimus,
si exactam simplicium vlcerū & affe
ctuum eis sæpe adiunctorum disci
plinam traderemus, quo facilius cō
posita persanemus.

Finis tertiæ Perioches.

PERIOCHE QUARTI COM
mentarij Therapeutices Galeni.

Esse prius corrigenda vitia quę
vulceris curationem impediūt.

Vnitatis solutæ curationem
esse coitionem proxime est
monstratum. Sed quia eam
sæpe impediunt qui simul adiungun
tur affectus, nūc opportunum est de
ijs orationem ordiri. Prius tamen in
memoriam reducto, vnum esse mor
bi genus, vnitatis solutionem. quod
sibi varia sortitur nomina: tū à mul

e. j.

PERIOCHE IIII.

Variety nis causis excitatur. Chymosis enim
tionis so quædam dicitur, quæ sæpe fit cū ru
lutę caus ptione & contusione, quædam præ
sa. terea ab anastomosi, diapedesi, ana

brofi, id est erosione: quæ si intrinse
cus puenit, vitiosi succi soboles est:
sin extrinsecus, aut à valentibus me
dicamētis fit, aut ab igne. Sed de ijs
alibi à Galeno traditū est. vlcus enī,
vt ad rem accedamus, nulla ratione
curari potest, si pilus, arena, sordes,
oleū, aliūdve id genus extraneū ad
fuerit. Præterea carnis subiectæ tem
peries, quę causæ efficientis rationē
habet, dum male affecta est, omnino
vlcus glutinari non potest. Sanguinē
præterea oportere esse, tum quantis
tate mediocrem, tum qualitate bo
num, antea est monstratum. Atque

Ægre sa
nabilium
vlcerū tri
plex mo
du.

hi tres ægre sanabilium vlcerū mo
di videntur: qui ex intemperie car
nis subiectæ prouenit, qui ex conflu
entis sanguinis fit vitio, ac demum
tertius qui ex quantitate affluentis
succī nascitur. Intemperies quidem
carnis pura est, vel cū humore, vnde
excitatur tumor: qui prius est, vt affe

ctus cæteri, curandus. Si autem pars
ita squalēs siccæque effecta est, vt vl-
ceris labra coire non possint, fomen-
tis humectabitur: humidior autem
iusto si fuerit, siccabitur. ac ita in alia
oppositione agendum erit. Verum
hic potissimū agitur de affluxu succi
in partē vlceratā, qui si nec multo co-
piofior iusto, nec multo deterior sit,
reprimi auertiq; debet, adstrictis vi-
delicet partibus propinquis, vincu-
lis à particula laborante in sanā de-
ductis, vt in ossium fracturis, tū etiā
am refrigeratis partibus quæ ante
exulceratā particulā sunt, fieri solet.

At ea quæ ad id admouentur phar-
maca, valentius siccent oportet, q̃ ea
quæ simplici parantur vlceri. Fluxus Quæ fluo-
autem sisti ac compesci ijs sæpe nō xū in pars
potest vel ob partis imbecillitatem, tem arces-
vel propter sanguinis copiam, vitio- ri prohi-
sūmve succum totius corporis, vel bent.
partiū suppositarū, quæ omnia pri-
us sunt corrigenda: imbecillitas qui-
dem (quæ ab insigni intemperie cō-
trahitur) ob frigus vehemēs, per ca-
lida: & contrā. ac ita demum in alijs

e.ij.

PERIOCHE IIII.

qualitatibus oppugnando affectum. Nam quæ per intemperiem aliquã à naturali habitu recesserunt, eorum sanationem per ea quæ cōtraria sunt viribus, fieri omnino necessum est. Ad eundem modum si alicuius particulæ vitio, aut totius corporis, cū in eo sanguis aut malus succus redūdat, influxus fiat in partem: medendum prius est vel ei quod fluxionis est causa, vel etiam toti corpori. Etiam qui ex liene, aut quavis alia notabili parte laborant, ipsa prius parte percurata, mox ad eorum vlcusis curationem accedemus. Ceterum intelligendū est nullā harū curationū ipsius esse vlcusis, sed alterius cuiuspiã affectus, qui vlcus vel gignit, vt partis intēperies, & vitiū humoris erodentis: vel certe fouet, vt affectus lienis, aut iecinoris, aut cuiusvis (vt est prius dictum) particulæ insignis.

Externam seu primitiuā causam nihil ad curationem, sed ad affectus cognitionem conferre.

Iam tempestiuū est mōstrare nullam externarum causarū curatio

nis indicatricem esse, sed huius indicationē ab ipso affectu initiū habere: quæ vero particulatim sunt agenda, hæc tum ab eo quod prima dictat indicatio, tum vero ab ægræ partis natura, tum ambientis temperie, ac demum alia, quæ sunt ijs cognata, inueniri. Nam affectum præsentem curamus, futurum autē prohibemus, id vero quod iam abiit, ut est causa externa, etiam si velimus, curare non possumus, quare ab hac indicatio sumi non potest, quis empiricus vnam esse partem totius cōcursus arbitretur. Cæterū si partim est affectus in fieri, ut dicunt, partim in factō esse, duplex proponitur scopus, nēpe curandū quod iā factū absolūtūq; est, prohibendū vero quod est futurum. atq; ita potest quidem indicare externa causa præcautionē, ea autem quæ iam abiit, nequaquā quod omne tibi vno aut altero exemplo fiet manifestum. Finge igitur vulnus natum esse ab humore qui in brachium procubuit, nam cum esse vitiosum clarum est, ita enim natu

e. iij.

Medici
opus du-
plex.

Rei præ-
sentis est
curatio,
future au-
tem pro-
uidentia.

PERIOCHÆ IIII.

ra in morbis facere solet cū corpus expurgat, omne excrementum trudit ad cutim, atq; hanc vlcerari, totū vero corpus purgari accidit. huiusmodi autē vlcaseodem modo atq; reliqua vlcera quibus nullus est adiunctus malign⁹ affectus, curari debet. vnde & clarū euadit nullam esse ad curationē à caussa quæ vlcus excitauit, indicationem. Atqui si succ⁹ vitiosus, vnde excitatū fuerat vlcus, remaneret, omnino ab hoc quoq; aliqua sumeretur indicatio. Ea enī (ne ab instituto dissiliam) quæ succorū vitio exulcerata sunt, curāt ij qui ratione ac methodo artē administrāt, simul illos purgantes, ac ea quæ naturæ opus impediūt auferētes. Quorum vtraq; qui exacte loquitur, prophylactica vocat. Sed ne omnino esse negligendam caussæ externæ cognitionem putes, non parum certe facit ad eum affectum noscendum, qui tum rationē, tū sensum latet. quod in febre ephemera sepe cōtingit, quæ nō semper primo intuitu statim ab omnibus distinguitur. quare scisci

tandum est ab eo, num sub dio dormitarit, an liberaliori cibo aut potu sit vsus, item vigilarit plusquā ex cōsuetudine, aut quippiam tale sit perpeſſus quod hanc febrē excitare ſolet. quōd ſi proculdubio idipſum adfirmarit, iam ab ea cognita cauſſa facile colligis prius tibi incognitum affectum.

De vlcere maligno ſeu cacoeſthe, quod parum apte curauit Theſſalus.

Diturna vlcera vocauit Theſſalus quæ melius cōtumacia appellantur. quorum quædam non ſaneſcunt, quædam vero ad cicatricē ducta denuo reuertuntur. de prioribus quidem nūc agamus, quæ ita ſanantur Theſſalo: Quæ coitionē fieri vetant, inquit, tollito, ac locum affectum innouato. Poſtq̃ ſimile vulneri recenti ipſum feceris, rurfus vt cruentum curato. Quod ſi non proceſſerit, phlegmonē mitigato, ac reliquam diligētīā adhibeto. Hęc ſunt illius inſignis videlicet methodici verba, quę quā inep̃te ſint appoſite.

e.iiiij.

PERIOCHE IIII.

ta longa oratione Gal. libro quarto
methodi medēdi edocuit. vnde hæc
pauca quæ sequuntur, vt reliqua, de-
cerpsimus. Principio enim hic errat
qui à tempore indicationē curatio-
nis sumendam esse censet. Nam vbi
si malis succis vlcus eroditur, diuer-
sam ex eo post quatuor menses indi-
cationem nō capiemus ab ea quam
statim initio sumpsimus. Est siqui-
dem statim in principio vlceris ipsi⁹
caussa adimenda, non autē expectā-
dum donec inueteratum sit, vt postea
ea locum nouemus affectum, & tan-
dem vt cruentum curemus. Confert
quidē tempus, vt est dictū de causa
externa, ad affectus agnitionem, nō
autem curationis indicationē. Quid
enim ad rem pertineat, si quod vlc⁹
inueterauit, adimere quæ coitionem
impediūt, & nouare locū, si propter
malignam fluxionem vlceris labra
male sunt affecta, anteq̃ fluxioni si-
stendæ consulueris? Siquidem cause
sa manēte quæ ea dura callosaq; red-
didit, ex ijs excidendis nil aliud ac-
cedet, q̃ vlceris amplificatio: quippe

*Cap. 40
inferi*

subito perinde afficientur atq; pri².

Quare hoc tanq̃ vetus dictū in omni curatione seruandum est, nempe

causas quæ affectus creāt principio esse abscindendas. Fieri tamē potest

vt sola labrorum durities causa sit cur nō in sese coeant, vti & sola par

tis intēperies: potest rursum & vārix superiacens, vel etiam alicuius

partis insignis vitium, prāter hāc partis agrē imbecillitas, ac maxime

totius corporis vitiosus succus. Nec min² vlcera vexat ipsa plethora, id

est, omniū succorum ex æquo inauētorum exuperantia: quæ certe omnes

causæ dum seorsim aut aliquādo inuicem permixtæ vulnē adiū

guntur, prius sunt auferendæ, quā finem tuum in hac re consequi possis.

Quod prēterea dixerit vetus vlcus vt cruentum esse sanandū, longe

fallitur. nam recens vulnus sine alio affectu solis adstringentibus & siccantib² tertio libro curauimus. Sed

hoc cacoethe vlcus necessario cauū est, cauitas autem prius oppleri debet: quā ratione multū differt à cru

Causæ vlc
ceris cois
tionē im
pediētes.

PERIOCHE IIII.

entorum vulnerum curatiōe, sed de
ijs quæ nō facile sanescūt haftenus:
nunc vero de ijs quæ denuo reuer-
tūtur, reliquam Thessali dictionem
adscribentes.

De vlcere obducto cicatrice, ac
denuo redeunte.

DVm vlcus se rursus aperiret
monebat Thessalus similiter
esse curandū ijs, quæ recenter phle-
gmone vexata sunt, tum malagma
te ex sinapis semine circumpositis
partibus ruborem excitandū, tū de-
mū totum corpus curandum, voci-
feratiōibus, gestationib⁹, citato etiā
ex radícula vomitu, ac tanq̃ supre-
mum, veratro dato. Sed q̃ inepte à
Thessalo sint hæc inuecta satis per
se clarum est. Nam sepe quod influit
natura acre est, nec medicamētis ru-
brefieri postulat: alioqui tota parti-
cula erodetur ac exulcerabitur. Sive
ro ea imbecillis foret ob insigne fri-
gus, aut plurimum humorem citra
vehementē calorē, optime procede-
ret curatio per rubrificatiā. Quocir-
ca distinguendū erat prius, an malis

gnū erat vlcus ob partis intēperiem
 vel propter fluxionis malitiam, an
 deniq; totius corporis vel partis ei⁹
 vitium. Nam cū ita sinapi particulā
 exusseris, iubet Thessalus ad totius
 corporis curationē accedere, inuer-
 so certe totius rei ordine. nam cum
 sinapis (vt & reliqua talia) ritu cucur-
 bitulæ trahat, profecto nisi prius to-
 tum corpus commode purgaueris,
 materiā fluxionis acri medicamēto
 relinques. Sed rem totam hoc vno
 exēplo ob oculos ponimus: Esto alius
 quis sanus, sed ex scabendo brachio Exemplū
 pustulam excitarit, quod iterū atq; de vlcere
 iterū pruritu vexetur, ac tandē pus- cōtuma-
 stula dirupta vlcus decolor inæqua- cis cura-
 liter erosum gignatur, atque hæc in tione.
 tribus quatuorve dieb⁹ à principio
 inciderint. Hoc equidē vlcus cacoē-
 thes esse dico, atque ob id corporis
 affectū cōtemplari oportet. inuenie-
 tur nanq; ex ipsius vlcereis accidenti-
 bus, tum ex corporis notis, vt est co-
 lor, tumor, dispositio, aliāq; plurima
 quorum meminit Gale. libro de ple-
 nitudine: cuius maxime generis sit

PERIOCHE IIII.

Error
Thessali
in curan
dis febr
bus.

is qui redundat succus . atque hunc
protinus medicamento educere fas
est. Nec est expectandum, donec to-
tus hominis cubitus contumacē re-
bellēmq; curationi affectum sibi cō-
traxerit, quod facitaret Thessalus,
qui nō potest intelligere vlcis ma-
litiā, nisi in multos dies ipsum pro-
traxerit. Verū id miri nihil est, cum
in febribus quoque grauius erret,
dum tertium diem expectat, vt vi-
delicet intelligat futura ne sit eo die
accessio. Ac interim illam quam pri-
mus inuexit diatriton , id est tridui
inediam imperat, qua hominem in
lectulo misere tabefacit: ac qui pri-
mo die poterat explicari, vix septi-
mo ad sua redit cōsuetā munia. Prin-
cipium vero huius erroris est, quod
affectum non dignoscit, a quo, vt est
prius dictum, omnis in curatione su-
mitur indicatio . quæ certe via est,
quæ ab eo principio ad finem vsque
ducens, in cunctis particularibus cu-
rationibus similis est. Quare etsi in
singulis morbis priuata quædā me-
thodus sanandi videtur , commune

tamen in omnibus genus est vnum. Auspicari nāque semper oportet ab indicatione quæ ab affectu cui medemur, accipitur: æstimare vero ac inquirere an causā quæ affectum excitauit, iam desierit: an nunc quoque ipsum tum augeat, tum faciat. Si deest, ad methodum traditam tertio libro est veniendum: sin adhuc facit, ad eam quam hic tradere paramus. Vbi simul est iam monstratum tempus ad curationem nil iuuare, sed ex hoc quod male affecta sit particula, ea vlcerata licet colligere. hoc vero inuento, & curationis ratio cōstabit. nempe vbi tantum hæ partes sunt affectæ, si has sanaueris: vbi totum corpus vitioso succo abundat, si hūc vacuaueris. Ac signum quidem ipsius vitiosi succi ipsa est diuturnitas vlceris. Inuentio autē illius quod expedit, nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio suggeritur. Quapropter hæc tria ita sese habent ordine, signum, ne affectus, curatio. Signum quidē malitie, ipsa diuturnitas. Affectus, succi vitium. Curatio eius, vacuatio. quæ

Causa æstimanda est.

Tria ordi
tia.

demum Hippocratis testimonio cō
probantur.

Hipp. ab ipsius rei essentia, non au
tem temporis diuturnitate indi
cationē perpetuo cepit: qui vlc
cus semper siccandum esse, (ni
si pus quàm celerrimè genera
ri oporteat) suadet.

MUltis iam rationibus cōfirmas
tum reliquerat Gal. primā in
dicationē in curatione ab affectu esse
sumendā, non autē à tēpore, quod ad
affectū noscēdū duntaxat iuvat. Ves
rū suā rem stabiliendā putavit Hippo
cratis testimonio, qui statim in prin
cipio libri, quem de vlceribus cōscri
psit, sic ait: Vlcera madefacere, quæ
cunq; ea fuerint, nisi vino non oport
et. tū causam adiiciens inquit: Nam
sano siccum viciniū est: humidū ve
ro non sano. & mox: Vlcus enim hu
midum est, sanū autem siccum. nam
vulceris sanatio, mediocris est siccas
tio: quæ nulla ratione esse rursū po
test, si quispiā simul adiunctus affe
ctus prius nō curetur. Quare per to
tum librū cū totius vlcerū curatio

Hippo
crates.

nis finē statuatur siccationē, mox particularia inuenit, etiā finis ipsius nos commonefaciens, dum ait, omne vlcus cæsim percussimve telo acuto diuisum, medicamentis enæmis ac siccantibus esse curandum. Sin vero ali **Contusa** qua caro telo tum cæsa, tum contusa caro supsit, huic ita medēdum est, vti quā puranda celerrime suppuret, cū sit necessum est.

carnes sic cōtusas putrescere, vt tandē noua gignatur. hac dictione Hippoc. solos eos vlceratarum partium affectus non esse siccandos ostendit, in quibus quamcelerrime pus generari cupimus, docens obiter cum aliqua putrescentia ipsum fieri. Porro omnia quæ putrent, ex calido & humido, vt docuit Aristoteles, sic acciuntur. Ideoq; ea cataplasmata quæ ex hordei farina componuntur, ceu quæ calfaciāt humectentq; puri mouendo sunt aptissima: quorum item materiā habes copiosam libro quinto simplicium: veluti sunt galbanū, myrrha, ficus pīgues, althea, chamaemelum ex quibus sic vnum mixtum compone medicamentum. ℞. radicis

PERIOCHE IIII.

Auic.fen
3. quart.

altheæ, cucumeris agreſtis, ſingulo-
rum vnciâ ſemis, origani agreſtis,
hyſopi, ana manipulum ſemis, florū
chamemeli, ſeminis lini, ana pugillū
vnum, ficuum pinguium, paſſularum
mūdatarū, ana numero ſex: vnā bul-
liant, ac tandem ijs preſſis ac diligē-
ter tunſis adde galbani, myrrhæ, ſty-
racis liquidi, ceſypi, ana drachmā vnā
ſemis, ſanguis draconis, adipis por-
ci, ana vnciâ ſemis: componatur ma-
lagma. Habes præterea ex Galeno
hoc cōpoſitū medicamen ad ſuppu-
rationē libro ſeptimo de cōpoſitione
ne pharmacorū quod vocat διαμυλλή-
λωτο. & meliloti manipulos tres, ſpi-
cæ celticæ, cyperī, cardamomi, ireos,
myrrhæ, ana drachmas duas, guttæ
āmoniāci drachmā vnā ſemis, tere-
binthinæ drachmas tres, croci drach-
mam ſemis, ceræ lotæ quātum ſuffi-
cit pro emplastro. Verum ſi quis plu-
ra deſideret, voluat ibidem Galenū,
Scribonium Largum, & Principem:
nam hic ſufficiat vnum aut alterum
adſcripſiſſe exemplum, quare ad rem
redeo. Ex Hippoc. igitur monſtratū

THERAPEVTICES. 41

est, omnia vlcera esse siccanda præter
ea quæ cõtusam simul haberent car-
nē: in quibus tum calfacere, tum hu-
meotare oportet, non autem vt dum
phlegmone adest quæ siccātia sua ra-
tione postulat, vt verbasco coctum,
trifolium, epipetrum, & polium, ve-
rum sæpe illi paramus calida tepide,
& humida, non quidem ad curatio-
nem, sed ad symptomatis mitigatio-
nem. Compendiaria enim partium
phlegmone obsessarū curatio per ea
præsidia obitur, quæ vel affectū pror-
sus submouent, vel si quid exiguum
reliquerint, alterum medicamētum
acre, quod educere pus queat, requi-
ritur, vel si tenuis sit cuticula, sectio
petenda est.

Ab affectus magnitudine indica-
tionem sumi, quem vehemētem
reddit partis præstantia, sympto-
matum magnitudo, ac affectus
malignitas.

MOrborum proprias differēti-
as nō nihil indicare in curatione
bus, libro tertio docuit Galenus, qua-
re cum necessario vlcus sit vel pars
f. j.

PERIOCHE IIII.

Sanguinis
mittendi
geminus
scopus.

uum vel magnum, erit hinc fumen-
da indicatio. nam magnitudo mor-
bi magnis indiget præsijs: ea autē
sunt, sanguinis missio, ac purgatio.
de missione igitur sanguinis, nūc a-
gamus, paulo pōst vero de purgatio-
ne. Phlebotomiæ enim duos esse sco-
pos author est Galen⁹: morbi vehe-
mentiam, & virium robur: qui dum
adfuerint, etiam quacūq; hora, vt est
demonstratū libro de sanguinis mis-
sione (non expectata empiricorū syn-
drome) audenter venam secabis: fit
enim sæpenumero etiā dum quis sa-
no sit corpore, & abundantis sangui-
nis expers, vt cogamur ipsum immi-
nuere: quemadmodū fieri solet in ijs
qui ex alto sunt prolapsi, aut quadā
plaga contusi: ne sanguis in corpus
imū refundatur, qui aut multitu-
dine, aut coitu, vitæ periculum tandē
inuehat. Nec sunt audiendi illi tri-
bolares medici, qui dum adest san-
guinis abundantia, protinus esse se-
candam venam iubent, cum nonnul-
lis satis sit inedia, alijs exercitatio,
frictiones aut balnea. Ita nec purga-

tio in sola vitiosi succi abundātia cō
 uenienter suscipitur, sed propter al
 terius succi abundantiam, & morbi
 magnitudinem. Quare dum sanguis
 abundat, euacuari: si autē succus aut
 flauus aut ater seu denique pituito
 sus, purgari medicamētis debet. atq;
 id tum de vlceribus, tum alijs affe
 ctibus esse intelligendum ex Hippo
 crate colligitur, dum ait: Omni recēs
 facto vulnere, nisi in ventre sit, expe
 dit ex ipso sanguinē statim plus mi
 nū sive effluere, quare si per naturam
 satis non effluxerit, quod deest, ipse
 adijcias oportet. Sed ne id pro solis
 vulneribus recens factis quis putet
 esse dictū, mox subiicit: Et ab inue
 teratis sanguis crebro fluat, efficere
 prodest, ve etiā à circumpositis par
 tibus. Atq; ita demum in memoriam
 reuocādum est quod alijs locis sæpe
 est monstratum. Incipientem fluxio
 nem ad contraria esse attrahendam Reuulsio
 per antispasin. Fixā vero iam in par
 ticulari laborante, vacuandam esse, vel Vacuādi
 ab ipsa parte, vel à maxime illi vici
 na: quare reuulsio ad longinqua, de
 f. ij.

PERIOCHE IIII.

Purgan-
dum esse.

riuatio vero ad propinqua fit. Vnde
iam clarū relinquitur in magnis vul-
nerib⁹ siue recēs natis, siue inuetera-
tis, mittēdum esse sanguinem, si duo-
scopi præpositi suadeant. Purgandū
vero esse aliquando, Hip. testimonio
probatur dum inquit: Purgatio per
aluum plerisq; vlcera prodest, præ-
terea vulneribus capitis, itémq; ven-
tris & articulorum, ad hæc in quib⁹
caries ossi impendet. Præterea quæ
suuntur & exedūtur, & quæ serpūt,
& reliquis quæ vlcera diuturna red-
dunt, etiam quæcunq; deligāda sunt,
per aluum purgari debent. His ver-
bis & alijs clare docet ex magnitu-
dine affectuum sumendā esse indica-
tionem, quos vehementiores reddūt
partis excellentia, symptomatū ma-
gnitudo, ac eorundem malignitas.

A partis sensus acrimonia, & he-
betudine, eiúsq; positu & figura,
sumendam esse indicationem.

Consummatius in sequētibus de
indicatione quæ ab ætate sumitur
ac humoribus sanandis dicetur, nam
hactenus de ea quæ à partium natu-

ra, & morbi tū essentia, tum magnitudine diximus. Quæ vero tum à positu, tum à forma, itémq; vñu, præterea sensus acumine, hebetudinéve indicatio suggeritur, quantū sit ad vlcera curationem vtile, ostendetur. Particulæ enim sensus acutioris, mitiori pharmaco: obtusioris vero sensus, valentiori sunt curandæ, quanuis eadē sit methodus in omnibus morbis. Et principis quidem membri robur seruari oportet, quod vero tale nō est, relaxādo remittēdoq; mitigari potest. Verū de ijs posthac fusius tractabitur. A positu ergo excogitatū est vt ventriculus exulceratus per ea quæ bibūtur & edūtur: gula vero per ea quæ tum crassitie, tum tenacitate, illitu diutius manente sanetur. Nam cum ea sit bibitorum cōmestorūmq; via, remedijs eget quæ adhærere, & vndiquaq; quasi concreescere, & agglutinari possint: non autē quæ elui deflueréque sint prōpta. Vlcera vero intestinorum crassiorum curāt clysmata: quæ vero in tenuibus habentur, quoniam & lōginquiora sunt, &

f. iij.

PERIOCHE IIII.

medio situ posita, ambo requirūt, & quæ superne sumūtur, & quæ per sedem infunduntur. Communis sane omnium partium internarum est, vt ea eligantur quæ maxime sunt animalis naturæ familiaria: vitentur autem contraria. nam quædam externis vlceribus sunt accommoda, internis vero inimica: qualia sunt, erugo, æs vltum, æris squama, cadmia, pōpholyx, lithargyrus, & cerussa. Sunt autem aptissima vlceribus internis curandis tum austera, tum glutinosa, tum minime rodentia. Si vero detergendum nobis sit, mel optimū ad id fuerit nō coctum. Ad glutinationem quidem optime faciunt, hypocystis, balauſtiū, cytini punīcorū, galla, malicoriū, bolus armena, tum rhois, rosarūmq; succus, & acacia, aliaq; id genus: nec vllum incōmodū inferunt. quæ quidem ex aliquo decocto adstringentiū danda sunt hac formula quæ sequitur. ℞. Sūmitatū rubi, myrti, cenanthes, ana manipulum vnū, rosarum rubearū, rhois, id est, sumach, ana pugillum semis, ba

laustij vnciam semis: fiat decoctio in vino rubro austero (si nulla sit phlegmones suspicio) ad librā semissem. In Pro sāguī qua misceatur hypocystidos drach^{is} nis vomī ma vna semis, boli armeniāci drach^{is} tu.

mē duā, mūmię, sanguinis draconis, ana drachma vna, sirupi cydoniorū vncia vna semis: misce, & seruetur in vsum. Verū aduertendū est similem indicationem esse ab ipsius trachię arterię affectu, vt videlicet quippiā transcoletur in eam, ac veluti aqua iuxta murū, ita liquor iuxta arterię tunicas sēsīm illabatur. Adhęc quoniam pulmones & renes alięq; partes longe distant à ventriculo, est opus valentioribus medicamentis, ne in via suas vires remittant: atq; ita Pręceptū egent medicamine tenui & calido, de cōpo^o quod vehiculi modo, ea pharmaca nendis in partes profundius deducat.

pharmas
Ecchymomatum curatio, indi
cations capta à situ partis.

Figuram itaq; ac positum indicare iam clarū est. nam cōmode deligare partem agram nemo potest, nisi prius vel ex positu, vel figura, vel

f.iiij.

PERIOCHE IIII

utrisque indicationē sumpseris. Sed
 nec immittere clysteris fistulā in se-
 dem, vel instrumentum quod græci
 cathetera vocant, in vesicam per pe-
 nem apte queas. Præterea in ruptis,
 quæ rhegmata dicuntur multæ con-
 currunt in idem indicationes. Nam
 propterea quòd & in profundo cor-
 poris sunt & latēt, idcirco diuersam
 curationem ab ijs quæ apparent pos-
 tulabunt. cum præterea sæpe consis-
 tant cum ecchymosi, plures indica-
 bunt curationes. Semper enim pro
 affectuum numero medendi indica-
 tiones respondent. At de ijs omnib⁹
 locupletius docebitur, vbi de phleg-
 mone disputabitur, simulque mon-
 strabitur quòd valentiora medica-
 menta requirant quæcunque in pro-
 fundis partibus laborant, quàm quæ
 in summo corpore sunt affecta. Ec-
 chymosis autem, de qua paulo ante
 dictum est, sanguinis concreti subter
 cutem, ac contusæ carnis euacuatio-
 nem indicat. curatio autem fit, etiam
 Paulo Ægineta referente, dum per
 initia aliquid astringentium misce-

THE RAPETICES. 45

tur cum digerentibus, eò quod con-
tufæ sunt venularum tunicae, quæ ad-
stringi postulant, Verùm non est vtẽ
dum valenter digerentibus, ne sub-
stantia tenuis educatur, maneat autẽ
crassior, scirrholis affectibus generã
dis accõmoda. Sed hic de vlceribus
sermo finiendus est, simũlque liber
quartus claudendus. Quoniam iam
satis ostensum est corrigenda prius
esse vitia, quę vlceris curationem im-
pediunt, ad quę nil conducit externa
caussa, nisi forsitan ad affectuum co-
gnitionem iuuat. vnde longe errauit
Thessalus in vlcere maligno, seu ca-
coethe curando, qui à tempore indi-
cationem sumendam esse arbitrare-
tur, quod sane falsum esse Hippocra-
tis testimonio probauimus: quando
ab ipsius rei essentia curando omnis
duceretur prima indicatio: post eam
vero locum habere, affectus magni-
tudinem, ac tandẽ partis sensum he-
betem vel acutũ, eiusdẽ positurã &
figuram vnus ecchymomatis cura-
tione est demonstratum.

Enume-
ratio.

Finis quartæ Perioches.

PERIOCHE QVINTI COM
mentarij Therapeutices Galeni.

De caussis hæmorrhagiæ ex ve
narum vlceribus.

Causse
hæmor
rhagiæ.

QVoniam igitur de ijs ma
xime vlceribus quæ in par
tib⁹ carnosiss accidunt, hæc
ten⁹ tractauim⁹: nūc
de venarum, arteriarūque in qua
uis particula solutiōe dicetur: ac pri
mo de vena, tum demū arteria: quo
niam ab eis sepe tam magnum ema
nat sanguinis profluuiū, vt vix in il
la, in hac vero penè nunquam vuln⁹
coalescat. quare de vtraq³ simul est
dicendum, prius tamen de sanguinis
profluuiō, secundo de vtriusque ag
glutinatione. Profluit autē sanguis
ex vena aut arteria, earum tunica di
uisa, aut reserato earum ore, aut de
nique sanguine (vt dicitur) trans
colato. Diuiditur tunica vulneratio
ne, cōtusione, ruptura, erosione. Oris
apertio fit ob vasis imbecillitatem,
ruentis impetum, humoris acrimo

niam. transcolatur sanguis, rarefacta tunica, sanguine tenuato, gracilium vasorum apertione. Dicendū est autem seorsum de ijs, primum vero de tunicarum diuisarum causa ex vulnere quæ est à corpore acuto & ad scindendū habili. Contusio vero est à corpore duro & graui in rem mollem, vt est caro. Rupturæ autem multiplex est causa: Tensio, succorū abūdantia, casus ab alto, actionis vehementia, vt clamor, saltus, tractus, præterea onus graue, ac denique flatulentus spiritus. Iis itaque sic ordine præscriptis, tādē ad vniuscuiusq; curationem seorsim accedendū est, ac maxime ad sanguinis profluxum ex tunicarum qualicunq; diuisione.

De supprimendo sanguine ex vasorum sanguineorū sectione, in superficie corporis.

HAnc vnā esse in omnibus morbis curandis methodum sæpe iam à nobis dictū est, & vt causam præsentem tollamus, præteritā vero negligamus, nisi forsan, vt est dictū, ad cognitionē affectus iuuat. Quare

PERIOCHE V.

Sanguis
primo
suppri-
mendus,
secundo
vlcus sa-
nandum.

Libello
de reuul-
sione.

videndum est an fluentis sanguinis
adsit, vel iam abiit causa. adest qui-
dem sepe dum fluit ob abundantiam,
quocirca imminuendus est succus. ab-
est vero dum ex vulnere, contusione,
clamore, aut casu perruptum vas est.
Quare hic solus erit curandus affectus,
atque ita primum sanguinem supprimere
expedit, exinde vlcus sanare. hoc au-
tem fit, obturato quod perruptum est: il-
lud vero, eo auerso, atque aliorum
conuerso quod per id ferebatur. Auer-
titur sanguis tum deriuatione ad pro-
xima, tum reuulsione ad contraria.
viti cum hypochondrijs affigitur cu-
curbitula, sanguinis ad nares impe-
tum reuocat: sicut & immodicum ab-
utero effluxum. Atque in summa, re-
uulsio molienda deorsum est humo-
ribus sursum fluentibus, & contra:
intro etiam vergentibus, foras: ac rur-
sum foras ruentibus, intro. Sin ad de-
xtram inclinaret, ad sinistram: ad sinistram
vero abeuntibus, in partem aduersam:
ac ita denique in reliquis est faciendum.
quod Hippocratis testimonio Apho-
rismorum libr. 5. cap. trigesimo secundo

do comprobatur, vbi scribitur: Mulieri sanguinem vomētī menses superueniētes remedio sunt: quare naturā artifex medicus imitari debet. Verum non importune hic notandū est, reuulsionē euacuatoriam, aut deriuatoriā esse: illam quidē, dum morbus adest, vel dum imminet. si morbus adest rursus, fluxit humor totus, vel adhuc fluit: quod fluxit & hæsīt, vacuandum aut deriuandū est: quod fluit, reuellendum per phlebotomiā aut medicamētum. Vacuatio autem fit sæpius dum hæret humor, per digredientia. Atq; ita demum omnes fluxiones (quippe promiscua est ratio) tum ad cōtraria reuocabis, tum per vicina deriuabis: utiq; quæ per aluū fluunt, ea vel per vrinas, vel vterum: quæ vero in oculis, aure vel palato fluxiones accidūt, per nares deriuari postulant. Sed eandem habere tum reuulsionis, tum deriuationis rationē ipsas frīctiones & ligaturas, ac naturalium meatuum, qui ex aduerso positi sunt, reclusiones, ipsa dudū probauit experientia, at de sanguinis a-

Ex libro
de sectione
venarum.

PERIOCHE V.

uersione hactenus. nūc vero de vul-
Vulneris neris occlusionē, quę fit vel labris dis-
 arteriarū fidētibus in idē adductis, vel osculo
 & vena vulneris obturato. Adducūtur siquis
 rum cura dē vel nostrarū manuū opera, vbi sic
 tio.

ad manū vlcus se exhibet : tum per
 deligaturam, tum per adstringentia
 & refrigerantia præsidia. non enim
 aut venam, aut arteriā suere fas est.
 Obstruitur autem vasis osculum san-
 guine cōcreto, vel ijs quę foris illi im-
 ponuntur. Possunt autem superim-
 poni tū carnosę partes vulnēri pro-
 pinquę, tum in nōnullis vulneribus
 ipsa cutis, adhęc & linamenta (ten-
 tas galli vocant) & medicamēta quę
 sua lentitia meatus obstruunt, tum
 p̄terea caustica medicamina, seu (vt
 vocāt) potentialia, vt est ærugo, chal-
 canthum, atramentum futorium, id
 est, vitriolum, multaq; alia, quorum
 materiā tradidit Galenus libris sim-
 plicium: seu denique actualia, vt est
 ferrum candens. ex quibus omnibus
 fit eschara, quę vice operculi vlcēris
 excogitata est. Postremo de ge-
 nere obturantium quodammodo est

vinculum ipsis profluētibus vasis in-
iectum, ac ipsi nostri digiti, dum ea
cōmittunt, stringuntq; de ijs autem
vinculis nunc perstringamus, postea
autem ad emplastica, & escharotica
medicamina reuertemur.

De venarum & arteriarum de-
ligatura, ac emplastico medi-
camine.

Non omnibus venarū vlceribus
vinculo succurritur, sed dunta-
xat ijs quę ipsis magnis venis infūt:
quę rursus aliquando veluti & ar-
terię præscindi debēt, præsertim dū
ex profundo loco recte assurgūt, ac
maxime per angustas vel principes
particulas. Quippe ita retrahitur
vtrinq; pars vtraque, ac celatur &
tegitur superiacentibus corporibus
vulnus. Tutius tamen est & vinculū
versus radicem vasis venę (dico) vel
arterię iniicere, & quod deinceps
habetur præscindere. Certum est ta-
men sanguinis profluuium ex arte-
ria sisti aut iniecto vinculo, aut ipso
vasē præciso. Nec est quod hic vere-
amur an arteria coalescere possit, quū

PERIOCHE V.

De arte sæpe Galenus grauissimos dolores
 riarū se pulsatorios curauerit secta arteria,
 ctione vis in qua spiritus flatuosus esset inclus
 de finē li^{is} sus, fluxumq; compescuerit obdu
 bri de cūcta videlicet arteriæ osculo carne, de
 ratione p qua paulo pōst latius dicetur. quæ
 phlebo^a re ad venam redeo. à qua si tam im
 tomia. modice fluat sanguis, vt obiter non
 sistatur, certe ipsum suppressere ci
 tra vinculū tentādum est, aliquo ex
 ijs quæ enæma, id est, sanguinem sup
 primentia dicuntur. sane horū opti
 ma sunt emplastica ea quæ ex resina
 frixa, & farinæ triticeæ tenuissimo
 polline, & gypso, alijsque id genus,
 sunt confecta. Quo genere certe cru
 entorū medicaminū potius est vtē
 dum, q̄ eorum quæ crustā seu eschas
 ram moliuntur. Quippe ex ijs peris
 culum est ne si procidat crusta, rur
 sum sanguinis hæmorrhagia excite
 tur. Optimum autem omnī ad san
 guinem compescēdum medicamē
 tum, & quod in primis commēdat
 Galenus hoc libro quinto, ac in fine
 libelli de sanguinis missiōe, hoc est:
 ꝑ. thuris candidi, mollis, & gūmosi

vncias duas, aloes lotæ vnciam vnā,
 candidum oui: ac simul omnia subia
 gito, eaque tandem mollissimo le
 poris pilo in vsum excipito. vbi au
 tem copiose vlceri & vasi ipsum im
 posueris, alligabis forinsec⁹ fasciam
 ex tenui linteolo, duces tamen ver
 sus ipsius vasis radicem, vt in reli
 quis deligaturis præcipimus vasorū **Deligan^o**
 pene oīm. ideo penè omniū dico, p^o **di mod^o.**
 pter cerebri mēbranas. nam vbi ab
 eis fluit sanguis, potius versus illas
 est deligatura molienda, ne copios
 us sanguis fluens nullā relinquat ani
 malibus spiritibus gignendis mate
 riam. Si vero tertio die adhuc medi
 camentum tuto hæret vlceri, aliud rursum
 superimpones, ac madefacies illud,
 velut linamentum ex pilis leporinis
 factum, ac denuo vt prius deligabis.
 at si hoc sponte deciderit, simile ite
 rum applicabis, radicem vasis blan
 de comprimens digito, quatenus ni
 hil confluat: ac manu altera velut su
 spensa medicamentum vulneri co
 aptabis. Ad hūc modum quoad car
 ne muniatur curabis vas ipsum, vti

PERIOCHE V.

que semper particulam supinam detinens, seruato tamen in hac situs figura modo. Nam figura situs plerūque dolorem excitat, quo /no nihil est quod profluuium magis prouocet, & phlegmonas augeat. Quare blande hanc affectam partem tractabis, & antequam medicamen prius impositum decidat, carnem productam esse expedit, maxime vbi est arteriæ vulnus. quocirca medicamenta exquirenda sunt tum emplastica ad obturationem. vt est thus, tum ad leuem deterfionē, vt est aloe, ex quibus est compositum hoc medicamē quo vtitur Galen⁹ & ad sphagitidas & arterias aliarum partium, multa sunt quoque emplastica medicamēta quæ citra dolorem talia sunt, sed non ita carne implent.

Escharam sæpe gignēdam, dum vrget necessitas.

Nonnūquam tam vehemens est sanguinis fluor, vt etiam crustificis medicamentis vtendum sit. verum ea non sunt admouenda, nisi diligenti cura prospexeris an quicquā

mitius auxiliari possit. Nā hæc partem carne nudam relinquūt, atq; ita magnum est periculum ne si crusta deciderit, maior erumpat sanguinis fluor. Tamen quū (vt iam est dictū) nos ita frequenter sollicitet, & premat necessitas, certe non erit negligendus aliquando eorum vsus. Verū quisquis in his methodo omnia administrare volet, is tū modos omnes quibus sanguis supprimatur longe cōsiderabit, tum eum eliget qui minus cum periculo erit. Quare quum sit formidādū ne præceps ruat à vulnere crusta, præstabit ea ad mouere medicamenta quæ cum sint vrentia vim quoq; habeant adstrictoriam, vt est misy, chalcitis, atramentum sutorium, ærugo, & plurima alia, quæ vero ex calce viua cōficiuntur, ea vti que valētiora ijs sunt, cæterum vim adstringendi non habēt. quocirca ad id optimum erit hoc compositū medicamentum à Galeno vocatū libro de compositione pharmacorū quinto Ischæmus magna. & misyos, viatrioli albi, ana vnciam semis, cortis g. ij.

PERIOCHE V.

cis pini, thuris & mannæ eius, squa-
mæ æris, ana drachmā vnā, æris vsti,
chalcitidis, ana drachmas sex, calcis
viuæ drachmas duas semis, gypsi tor-
refacti drachmas tres semis: tritis vti
tor. Multo plura describerem, sed lo-
cum indicauisse vnde haurire possis
sat est. Longe tamen satius esse no-
tabis, si carnem prius generare pos-
sis in profundo iuxta vasis apertio-
nem, quæ efficiatur veluti operculū
profluēti vasi. Vnde nec nosmet præ-
cipites esse ad crustas (vbi hæmorrha-
giæ periculum imminet) detrahē-
das oportet, nisi in illis affectibus in
quibus propter putredinem candēs
ferrū corpori hominis admouimus.
Appellant autem hunc affectum me-
dici græci *voμῆν* à verbo *viμῆν* quod
pascere significat, propterea q̃ pascē-
do ab ægris ad sanas particulas sero-
pat. Porro hunc affectum ex putre-
dine, quam sæpius gignit erodēs suc-
cus, oriri, theorema est medicū. Qua-
re cum & pudenda, & sedes tempe-
ramento sint humido, tum canales
quoq; sint excrementorum, certe fre-

THERAPEVTICES. SI

quenter putredine vexantur, atq; idcirco sæpe escharoticis indigēt præsidij. Verum de ijs quæ in superficie corporis apparent vasorum vlceribus hætenus, nunc autem ad ea quæ latent in profundo, serie dictionis agamus.

De vasorum sanguineorum vuneribus in profundo corpore.

Sanguinis profluvia ex profundo corpore non deligaturis escharoticisve medicamentis compescimus, sed reuulsione, deriuatione, animi deliquio, cibo potuq; qui & emplasticam vim habeant, & refrigerent: tum postremo medicamentis quæ adstringant. Indicatio vero à partibus sumpta, omnibus quidem quæ prius dictæ sunt indicationibus curâdi veluti auctarium in singulis affectibus accedit. Siquidem instrumentis aliquândo vtimur pro partiû proprietate, alijs ad vterû, alijs ad vesicâ, vt est illud quod græci catheteras galli vero chirurgi gargariâ vocant, alijs ad intestina, vt est clyster. Rariora sane ex his partibus fiunt pro
g. iij.

PERIOCHE V.

fluuia sanguinis, quæ quâuis ipsa p
fusione multum non sint periculosa,
ob diuturnitatem tamē citra pericu
lum non sunt. Visæ sunt enim mu
lieres post editum partum perire ex
immodico per vuluā sanguinis fluo
re, qui aliquādo sistitur infecto cum
alijs ad id commodis medicamētis,
plantaginis succo. Nam in his quæ
ex vuluā, intestinis, aut vesica citan
tur profluuia, æstimari debebit ipsi
us profusionis quātitas, vt videlicet
hanc iam vel vt primam, vel secun
dam curationis indicationem habea
mus. Nam si perruptū vas aliquod
magnū est, aut vehemēter reclusum
hiat, utiq; adstringētibus medicame
tis est opus, veluti balauustio, hypoci
stide, rhoë, ophacio, acacia, gallis im
maturis, & malicorio. Sin exiguū vas
est perruptum, vel modice reclusum,
ita quod modicus sit qui effluit san
guis, etiam aloë, manna, pini cortex,
bolus Armena, spine egyptiæ fructus,
crocum, & lapis hamatites, aliæque
id genus ex vino nigro austero & tri
lia medicamēta sunt. Præterea dum

Profluui
um ex p
rupto va
se profun
do.

nō est ad manus hoc vinum, iuuabit decoctū ex rubi summitatibus, myrti, lentis, & hederæ, ac denique ex omnibus vim adstrictoriam habentibus. At si ex rosione fluor sanguinis incidit, solet esse modicus: quare ne hemor vel Pasionis, vel Andronis, vel Polyi rhagia. de pastillis vtendum est, quos describit Galenus de componendis pharmacis libro quarto. ex Polyida sic habetur, imminuta sola simpliciū quantitate. ℞. Aluminis fissilis drachmā vnā, thuris, myrrha, ana drachmā vnā semis, chalcanti scrupulos quatuor, citinorum drachmas tres, aloes drachmas duas, fellis taurini drachmas duas semis: cū vino austero oīa subigito. At verō profluente particulæ extrinsecus non sunt principio & frigida & adstringentia medicamina adponenda, nam intro repellūt, & venas quæ in alto sunt implent: vnde nonnulli ex refrigerato sic thorace ob sanguinem ex pulmonibus reiectum læsi sunt, aut ventre refrigerato, dum sanguinem vomerent: vti quibus ex naribus sanguis profluxit, g.iiij.

PERIOCHE V.

Diapede
sis.

aliqui ex capitis refrigerio deterius
habuerunt. ergo nec semper, nec si-
ne discrimine est ijs vtendum : imo
postea quàm aliò fluxum auerteris,
veluti est in sanguinis ex naribus
fluore, vbi gemin⁹ est auersiois mo-
dus, & ad inferna, & ad posteriora,
adhibita scilicet in ceruice cucurbi-
tula. Verum de sanguinis profluio
hactenus. Patet nanq; diapedesin re-
frigerantibus, adstringentibusq; esse
curadam. Si vero propter sanguinis
tenuitatem incidat, crassiore victu,
de quo postea dicem⁹, curabit^r. Ergo
quod venæ insedit vlcus, vbi ad ma-
num est, eandem desiderat curationē
ijs quæ in carne accidunt. nam si ex
recenti vulnere est factum, vnietur
enæmis, id est, sanguinem suppressi-
tibus. Si autem ex erosione, quæcun-
que de contumacium vlcum cura-
tione sunt dicta, erunt prius ratione
discernenda: mox vt opere perfici-
tur tentanda. Quinetiam vbi vincu-
lo vas sis complexus, aut medicamē-
tis enæmis, aut candentibus ferra-
mentis vsus, illudque tibi curationis

THERAPEVTICES. 53

propositum restet, vt quæ sunt circa
vulceris labra carne impleas : ijsdem
medicamentis vtere, quæ in metho-
do sinuosorum seu canorum vlcerũ
sunt præcepta.

Arteriam experientia & ratione
coalescere probatur.

PER somnia monitus Galenus ar. De sãgui-
teriam audenter secuit in grauis nis missi-
simis doloribus qui fiunt à flatuoso one libro
spirituosoque humore, vti fecerat in
quodam ministro dei Pergami: secta
siquidẽ arteria in summa manu, fuit
ille diutino lateris cruciatu liberat⁹.
Præterea arteriã in malleolo icisam
ob inflictu vulnus cuidã iuueni idem
curauit, vt refert libro de curandi ra-
tione per phlebotomiam. Quare ex-
perientia clarum est, arteriam, si par-
ua mollisq; fuerit, coalescere. In cor-
poribus autem senilibus ac duris, ar-
teria quoq; existente insigni, id fieri
posse Paulus quoq; libro sexto in to-
tum negat. Nam cum dura corpora
coitionem refugiãt, mollia vero hãc
admittant, fit vt in puellis & mulie-
ribus facile coalescant. medicamen-

PERIOCHE V.

ta autem quæ id præstant, in ratione
maioris ac minoris differunt ab ijs
quæ venis sectis medentur. Quod si
carnem circa gigni est opus, eadem
ambæ requirunt. Quæ vero in ytero,
vesica, vel intestino sunt vlcera, eadē
plane genere medicamēta requirūt.
instrumenta vero pro situ figuræque
partis, varia sunt excogitanda: pro
quorum specie, remediorum crassitudo
variabitur. Nam per ea infunduntur
non quidē dura & crassa, sed
potius liquida. atq; idcirco medicos
criter calida & sicca magis sunt ido-
nea, quàm ea quæ liquabilia vocantur,
quoniā facile vel plantaginis, vel al-
terius generis succo misceantur: quæ
sunt pompholyx, crocus, aloë, &
quæ cephalica, id est, quæ ossium in-
ueteratē vlcera curant, dicuntur. Dum
autem est suppressus sanguis, ac caro
generanda est, Lemnia terra seu bolus
Armena auxiliū est salutare. Sed de
arteriarū coitione latius disputabitur
in perioche tertijdecimi & quat-
todecimi commentarij Therapeuti-
ces, vbi simul de aneurysmate quan-

tum ad eius causam, ac generationem, docebitur.

De pulmonum vlceribus quæ
ægre curantur.

Clamoris, exercitij, casusve vehementia multisq; alijs de causis pulmonum vasa sæpenumero rumpi solent, ipsiq; pulmones vlcerari: qui profecto nisi prius curentur, quam phlegmone oriatur, omnino sanari non possunt. Nam quod vnitur qui escere ac repurgari oportet. Verum hi perpetuo ob vitæ necessitatē moruētur dum thorax dilatatur. Præterea nulla alia ratione purgari potest sanies, q̄ per tussim quæ vehemens est motus, vnde vulnus denuo dilaceratur, adde quod lōge distant. quapropter medicaminum vires magna ex parte exoleuntur priusquā illuc perreptent, postremo substantia cū sint laxa & spongiosa, facile omnem de fluxum admittunt, qui maxime glutinationi obfistit. Verū si quis principio diligētem ac studiosum sit natus medicum, poterit quidem vlcus sanari, alio prius imposito silentio.

Causæ
tur pul
mo vlce
rat⁹ ægre
curari po
test.

PERIOCHE V.

Secundo misso protinus sanguine, si vires suadeant, ex interna cubiti ve
Curantur, non quidem semel, verum mul
ulcera tis repetitis vicibus, auersionis gra
pulmonū tia. Tertio vinciendi fricandiꝫ sunt
artus. Postea vero posca seu oxycra
ton est propinandum, vt si quis cru
or illic cōcretus sit, resolutus expua
tur. Ab ijs vero aliquid eorum me
dicamentorū quæ tum adstringunt,
tum emplastica facultate obstruunt
exhibēdū, idꝫ aut posca, aut ex ma
lorū myrtorūmve, vel alicuius eius
modi adstringentium decocto. Rur
sūꝫ vesperi hoc medicamentum si
militer est dandū, circunciso (si vas
lentior sit) omni nutrimento: sin ali
ter, quidpiam sorbitionis exhibēdū
est. Ac ita secundo die erit tractan
dus æger, mittēdūꝫ pariter sāguis,
idꝫ faciundum vsꝫ in quartum diē:
pectore interim malino rosaceōve, si
æstas fuerit, madefacto: sin hyems,
nardino. Si vero corpus sit molle, vt
in pueris aut mulieribus, aptiss. erit
illud quod primo de pharmacorum
mistura Galenus *δὲ καλκίτας* vocat

THERAPEVTICES. 55

uit. Accipit autem adipis porci vnciam semis, olei veteris drachmas sex, argenti spumæ vnciam semis, chalci tidis vnciam vnam: pila tunduntur in mortario cum palmarum succo. Sūt præterea alia non pauca quibus misceri solēt enēma medicamēta, quorum meminit Galenus libro de eorū miscella. Atq; ita certe plurimos curauit Galenus, qui tamē prius illi se se committerent, quā alia inflāmatio eos inuaderet. Cæterum non mi Thrōbus nus te terreat, si non multū sanguis in pulmone tussiendo euomatur, cum possit nibus. thrōbus illic in asperis arterijs concretus viam præcludere, vnde putredo phlegmonēque gignatur. Simili modo & septi trāfueri vulnera quæ foras non perueniūt, in carnosis quidē partibus subinde coalescere sunt visa: quanquā, si phlegmone accesserit, ægre curationem admittunt: quæ autem in nervosis eius partibus hærent, omnino insanabilia sunt. qua ratione rursus vix curātur omnia quæ in peritoneo contenta sic afficiūtur: quod in ea scilicet sanies defluat. Por

PERIOCHE V.

rò danda opera est, vt ea quacunque
ratione siccemus, siue foris siue inte-
rius admouēdo præsidia, tum per ea
quæ ex aqua vinôq; tenui bibuntur.
Præterea omnium maxime ad id est
idoneum dia spermaton medicamē-
tū, quod recipit seminū anisi, fœni-
culi, ameos, ana vnciā semis, seminis
apij, alterci, opij, ana drachmā vnā
semis: quæ aqua tūdūtur ac in pastil-
los formātur. Sūt postremo tum alia
liquida foris applicanda, quæ nostra
perioche latius explicare prohibet.

Esse obseruandam naturam, si-
tum, figuramque partis.

Mihi sane repetendum non erat
in diuersis corporis partibus
curationis speciem immutandā esse,
quoniam ad finem quartę perioches
idpsum & experiētia & ratione fue-
rat demonstratū. Verū quia Galenus
hoc in loco proluxa admodum nar-
ratione iterū probare contendit aliā
esse in oculo, naso, ore, vētriculo, pul-
mone, femore, ac pudendis curandi
rationē, fore cōmodum putauimus,
si vnum duntaxat ex eodē loco huc

traduceremus exemplum, de simpli
 ci vulnere auris, quod quidā Theſ
 ſalius ſuſceperat curandū: qui prin
 cipio medicamen ex cadmia appo
 ſuit, vnde putredo ac ſanies copioſe
 oborta eſt, non alia ſanè de cauſſa q̃
 quòd id nō ſatis proillius partis tē
 perie ſiccaret. Secundo autem quum
 arbitraretur interius obortam eſſe
 phlegmonē, confugit ad Tetraphar
 macū, quod recipit colophonīæ, pi
 ſcis, reſinæ, cerę, ſeuī taurini, ſingulo
 rum partes æquas, vnde vim habet
 maturandi non ſiccandi. Ac ita de
 mum aurem totam putridam reddi Tetra
 diſſet, niſi Galeni (vt refert) opera, pharma
 fuiſſet reſtitutus: non quidem tranſ cū cui ad
 eundo protinus ab ijs medicamētis ditur tau
 laxantibus ad arentia, ſed paulatim ri ſeuum.
 ad valenter ſiccantia peruenit, quo
 niam parti ſicciffimę admederetur.
 Si vero potentiora deſiderētur me
 dicamenta, vt ad aurem quā vnū
 aut alterum annum vlcus infeſtauit,
 optime fecerit ſcoria ferri tunſa crī
 bratāq; leuiter, cum acerrimo aceto
 ad mellis ſordiumq; craſſitudinem

PERIOCHE V.

decocta. Quæ autem vlceribus oris succurrunt humidioribus, egent valenter siccantibus, vti sunt iris, Anthera, diphryges seu per se, seu cum vino, melle, vel mulsa. quæ vero magis sunt simplicia vlcera, etiam modice siccantibus curari possunt, quælia sunt quæ stomatica ob vsum continuū dicuntur: vti quod paratum in officinis habetur diamorum, dianuscum, ac pleraque id genus alia. Porro dicta paulo ante sunt ad quæ partem idonea medicamentorum genera, quibus vtendū sit in singulis: genere quidē medicamenti ab ipsa curandarum partium essentia desumpto, sed cum affectu prius etiā æstimmato: modo vero vtēdi eius tum à forma, tum etiam situ. Hinc nanque auricularij vterinijq; clysteres, ac catheteres excogitati sunt. Hinc rursus quæ in vetriculo, pulmone, ac pectore vlcera constitere, per ea quæ eduntur ac bibuntur esse curanda intelligitur. Quæ vero intestina fatigant superiora, per bibita, & comesta: inferiora vero, per clysteres, quum

utrinq; longa sit via: vnde dum illā permearent medicamēta, certe vim suā plurimum remitterent. Gemina quoq; ratione ventriculus expurgari potest, vomitu, & deiectione. verū quum vomitus vehementi fiat motu, periculū est ne & quod vlceratū est dilaceretur, & succus quispiā inutilis ex vicinis attrahatur, quo nomine vt dictum est pulmonis vlcera curatu sunt difficillima, quæ nisi prius cicatrice obducantur q̄ phlegmone prehēdantur, vt paulo ante dictū est, omnino salus desperata est, quauis possit aliquātisper vita progari.

De vlcere membranæ interioris, asperæ arteriæ, ac de Tabiarum lacte quod phthificis prodest.

Sæpenumero vulnus fieri ob erod. **Causæ.**
 sionem à spiritu vel humore acrim in tunica interiori asperæ arteriæ no uerunt qui defluxionem mordacem à cerebro in pulmones, aut ex ardēti febre spiritus quoq; acres perpassi sunt. Veluti ille iuuenis qui Romæ nouem dies pestilentia passus, vt refert Galen⁹, toto corpore multis vlc
 h.j.

PERIOCHE V.

ceribus est affectus, ac eodē die paulū tussiebat. Postridie vero vbi se lauerat, illico vehemētius tussit, ac ita tussiendo crustulam expulit, quā tum ex doloris situ & proprietate facile erat intelligere reiectam esse ex arteria quæ est in collo prope iugulum. Huic suavit Galenus ne tussiret, quod & fecit, eo certe facilius, quod exigūerat quod proritabat: ac omnibus modis studuit vt vlcus cicatrice obduceretur, appposito foris siccante medicamento, eoque quod in ore retentum roris modo in asperā arteriam trāsumitur, ac ita eo medicamine ad tussim facile mouebatur. Sed quā potuit maxime eam sibi compescuit, qui sponte triduum Romæ post diem nonū est moratus: post hoc autem quarto die vect⁹ est ad Tabianum collem non procul à Neapoli vbi est lacte vsus, quo tandē persanatus est. Verum quoniā mirificæst ad phthoen illius lactis natura, Galenus locum ita depinxit, vt & situm, & stirpes, aerisque constitutionem narrando non omiserit, idque

vt in summam colligeret, lac quod
 ex bobus, capris, aut iumētis quæ il-
 lic vefcuntur, emulgetur, tum leni-
 ter detergentē, tū adstringentē, ac sic-
 cantem vim habere, quæ omnia vl-
 ceratis partibus, maxime pulmonis
 bus, admodū vtilia sunt. At quoniā
 non omnes regiones, illius montis
 commoditate frui possunt, oportet
 saltem eligere locum quā fieri po-
 terit natura, sitūq; illi simillimū, in
 quem boues, capras, ac iumēta abis-
 gas: illicq; sunt herbæ, agrostis, id
 est, gramen, & lotus syluestris, quam
 latini trifolium minus vocant, & po-
 lygonon, barbari cētinodiam dicūt,
 ac deniq; melissophyllon seu citra-
 go, melissam Galli appellant. Frutis-
 ces vero sint arbutus seu vnedo Plin-
 io, rubus & hederā, cytisūq; Ro-
 manis trifoliū maius. alijq; similes,
 quibus lac animantium, tum facile
 alimentū, tum vtile medicamētum
 phthificis efficitur. verum notādum
 est summopere vt illud adhuc calore
 animalis genuino tepescat dum bi-
 bitur. quare lac muliebre lōge com-
 h. ij.

PERIOCHE V.

modiff. erit gemina ratione, tū quòd
à māmīs mulgere æger non ita recu-
set, tum quòd temperamētum reti-
net humanum, vnde facilius in eius
naturam vertitur. Secundas partes
tenuitate sua asininū, post hoc autē
caprillum, postremas autem bubulū
lac in ijs affectibus obtinet.

De sanguinis è pulmonibus reie-
ctione, ob catarrhi in eos deflu-
xum, ac instrumentorum spiri-
tus refrigerium.

Quemadmodum vas in pulmo-
ne ob lapsum ab alto, clamo-
rem, pondusve fractū curari debeat,
iam absolutum est: nunc vero de cu-
randa hæmorrhagia eiusdē ob catar-
rhum est dicendum, idq; vnius gene-
rosæ mulieris Romanæ exēplo, quā
Historia. hac ratione curauit Galenus. Primo
acrem iniecit clysterē (sanguis enim
non fuit mittēdus, quoniam quatri-
dum in ediam ob catarrhum tolera-
uerat) tum crura manūsq; calfacien-
ti pharmaco plurimū fricuit, ligauit,
mox caput abrasit, cui deinde medi-
camētum ex stercore columbino ad

posuit, tribusq; interpositis horis in
 balneum duxit ac lauit: idq; vt spe-
 ro, ad rapiendum humorē ad cutim,
 reuellēdo, sed caput non inūxit: dein
 pro eo qui tunc erat temporis statu
 caput pileo contexit idoneo ad cere-
 brum roborandum, nutriuitq; sola
 sorbitione, post quam statim fructū
 aliquem austerum dedit. Ac tandem
 cū dormitura esset, trimestrem obtu-
 lit theriacen, quæ ea ætate somnife-
 ra est, & fluxiones tum siccāt, tum le-
 uiter crassat, ob solum dūtaxat opiū,
 quod procedente tēpore veluti igna-
 uū ad hæc redditur. Atq; ita arctatus
 est catarrhus, sed pulmo adhuc ob id
 quod affluxerat purgatione egebat:
 cæterum eam non exhibuit, secundo
 saltē die, sed muliere seruata in om-
 ni taciturnitate & quiete, tum artus
 bus perfricatis vinctisq; iussit omnes
 partes præter caput adfricari: vespe-
 ri autem rursus theriacen paulo li-
 beralius quàm antea dormituræ de-
 dit. Tertio autem die mane mel co-
 ctum copiose propinauit, ac in quies-
 te seruauit: procedente vero eodem
 h. iij.

PERIOCHE V.

Altera hi
storia.

die totū corpus perfricuit, ptisanęq;
cremorem cum pane exiguo pro ci-
bo sumere iussit. Mox quarto die ma-
ne theriacen in ætate vigoris consi-
stētem cum melle copioso dedit. Ca-
piti vero medicamēto eodem quod
vehemēter tum siccatur, tum calfacit,
imposito, ac deinde ipsa lota nutris-
tāq; modice, valentius iam pulmonē
expurgare quinto die est aggressus,
ac rursus ex interuallo ad caput cera-
to quod thapsian recipit est vsus, to-
tam vero corporis curā in gestatio-
ne, frictione, ambulatione, lauandiq;
abstinentia, ac victu tum moderato,
tum boni succi ad reficiendum dire-
xit: ac ita mulier recte habuit, lactis
opem minime requirens. Adolescenti
vero cui non ex catarrho, sed spi-
ritus instrumētorum refrigerio tus-
sis orta fuerat, cum & ipse sanguinē
ad vncias circiter quatuor reijceret,
venā illico scidit, ac bis eodē die ab
eadē vena sanguinē detraxit, deinde
rursū postridie bis: sed artuū frictio-
ne, & vinctura priore die vsus, ad ve-
speram pharmacum dedit quod dia

spermaton dicitur, somnū enim con-
 ciliat, dolorem sedat, siccātque. Recis Dia sper-
 pit autem seminum anisi, foeniculi, asmaton,
 meos, ana vnciā vnā, apij, alterci, &
 opij, ana drachmas tres: quibus tritis
 & quodam apto liquore exceptis for-
 mantur pastilli. Post alteram sangui-
 nis detractionem secundo die pecto-
 ri ceratū ex thapsia admouit, sed no-
 ctu abstulit, quod calidius foret. Ter-
 tio die ad tres horas rursus eo impo-
 sito hominem lauit. Cibauit autem
 tribus diebus similiter: primo quidē
 & secundo sorbitiunculis, tertio ves-
 ro primum cremore ptisanæ, dein-
 de pisce aliquo, qui & faciliis concoctu
 esset, & simplici ratione preparatus,
 adiecto: dedit præterea ad secundum
 & tertium diem dia spermaton dor-
 mituro. Tum vero cum partes spiri-
 tui seruiētes naturali temperamento
 essent restituta, & totum corpus va-
 cuatum, ac nulla phlegmōnes suspia-
 cio circa ruptum vas superesset; ex-
 purgare coepit. Mox bibita theriaca
 iam ætatis matura, ad Tablas dimi-
 sit. Sic omnes qui se Galeno primo
 h. iij.

die curādos permiserūt, curati sunt:
 qui vero postea, non omnes: sed ali
 quibus eorum insanabile vlcus per
 mansit. verū qui per omnia præsidia
 rite trāsierunt vt siccaretur vlcus, ij
 tantum saltem lucrifecerunt, vt illud
 nec vltra progrediretur, nec maius
 fieret, sed siccatum ac callo duratum
 longiore vita frui hominem sineret.

De pulmonum vlcere ex vitiosi
 succi erosione.

Idemum inter alios qui vlcus in
 pulmone habēt insanabiles viden
 tur, qui ex succi vitiosi erosione id
 possident: verum cum ex eo tussirēt
 nonnulli, non tamen etiamnum san
 guinem reijcerent, Galeni prouiden
 tia prorsus sunt persanati. Oportet
 enim in principio nullius rei tam ef
 se sollicitum, q̄ vt neq; tussiant, neq;
 ex capite aliquid in pulmones decu
 bat. Cauebitur autem triplici præsidi
 o, purgatione primū, secūdo medi
 camine quod dia spermaton dicitur,
 tertio ipsi capiti prouidendo. Quod
 purget, diuersas facultates habeat o
 portet. Cuius generis sūt pilulae quae

THERAPEVTICES. 61

recipiunt aloes vnciam semis, agari^{is} Pilulæ ad
 ci drachmas tres, scāmonij, colocyn^{thidis} ōnes hu
 thidos, ana drachmā semis, bdellij, mores.
 gummi arabici, ana scrupulos duos:
 & cum succo cydoniorum malaxan
 tur in formā pilæ. Dia spermaton sol
 uetur vino austero, aut quouis alio li
 quore similis facultatis. Capiti vero
 providebitur cerati vsu quod sit ex
 thapsia seu aliquo cerebrū tum sic
 cante, tum roborante. Atq; ita princi
 pio hæc peragēda sunt, post vero re
 ficiēdus æger salubriter est cibus bo
 ni succi, frictione, inambulatione, &
 balneo. Sed in primis notādū est eos Istis lac
 esse qui maxime lac requirunt, ne necessa
 gleſtōq; eo, omnium maxime sunt rium est.
 insanabiles. Cæterum si parum san
 guinis habēt, ijs ad quēdā probiorē
 succum reductis, sanguis mittendus
 erit, tum rursus reficere: eosdem de
 nuo purgare, ac rursus reficere, tan
 demq; multis repetitis vicibus, id fa
 ciendū, donec æger sit pristinis viri
 bus restitutus. At qui validi sunt mul
 tiq; sanguinis, ijs statim à principio
 est detrahendus. vnde fieri omni

no non potest, ut hos affectus curent.
Cur Erasistratus qui à sanguinis missione abhorrent
 stratus sã uti Erasistratus, qui ideo id censuit,
 guinem ut, sanguis servaretur ad tempora
 nō mit phlegmonarum in visceribus, ne ob
 tit. eius inopiam agrum nutrire cogamur,
 quod rursum viscera exacerbaret.

Quare denuo illi longe errat qui in
 ijs affectibus quibus ingens imminet
 periculum, a minoribus præsidio
 is esse incipiendo, mox si nihil pro
 fecerint, aggredienda esse maiora,
 aiunt. Nã in morbis in quibus mors
 non impedit, vera est opinio: at ubi
 moriendum agro prorsus est, si phthoe
 semel exceptus sit, alienissimum a rati
 one est, a minoribus incipisse. Nã
 testante Hip. Extremis morbis ex
 trema exquisita remedia opus sunt.
 Cum postremo sapientia sit prius
 monstratum, eandem pene esse om
 nium ulceratarum partium curan
 darum methodum, diversam tamẽ
 indicationem, ob temperamentum,
 situm, figuram, compositionemque
 partis, superest ut breviter summan
 huius quintæ perioches perstringas

THE RAPPEVITICES 64
mus. Primo enim causæ fluoris sanguinis ex venarum arteriarumque ratio, vulneribus tradita sunt. Sanguinem vero supprimi monstrabatur eo averso, atq; alio sum conuerso: auertitur autem reuulsione, dum fluit, ad contraria: dum fluxit vero, deriuatione ad propinqua. Postea deligatura venas maiores vti & arterias sepe excipiendas, nonnunquam emplastico medicamine obstruendas, vel denique eschara (vbi virget necessitas) occludendas esse pariter ex Galeno monuimus. At quoniam hæc ipsa internis vasorum vlceribus applicari non possunt, sanguinem esse comprimendum etiam vti in illis reuulsione, deriuatione, animi deliquio, cibo & potu qui vim emplasticam & refrigerantem habeant, ad hæc medicamentis adstringentibus est ostensum: non tamen omnino virtute similibus & vena & arteria (quæ aliquando in corpore non indurato coalescit) curantur: nam cum arteria temperamento sit sicciore, quàm vena, desiderabit utique quod valentius siccet. Exinde præci-

PERIOCHE V.

quam causam cur ægre pulmonum
vulnera curantur orationis sequela
indicatum est esse repurgandæ sa-
niei necessitatem. ea autem non ex-
purgatur, nisi per tussim: quæ quum
sit motus violentus, vulnus denuo
irritatur exasperaturq; . sæpenum-
ro etiam interiorē trachiæ arte-
riæ mēbranam vlcerari intacto pul-
mone, sed qui facile postea afficere-
tur, cuiusdam iuuenis post pestilen-
tiam sic laborantis exemplo, qui tã-
dem ad Tabias vectus, est persanatus,
indicauit Gal. vbi lactis varias spe-
cies ad phthoe consumptos utilis,
meminit. qui postremo curationem
reiectionis sanguinis è pulmonibus ob
defluxum catarrhi, ac spiritaliū in-
strumentorum refrigerationem tū-
demum ob vitiosi succi erosionem,
amplissime tradidit.

Finis quintæ Perioches.

PERIOCHE SEXTI COM-
mentarij Therapeutices.

Duriorū corporum curationē hoc
libro tradi, varias quoq; vulne-
ris neruorum differentias esse.

SVperioribus progymnasmatibus
iam palam factum est vnicuiq;
parti à suo continuo solutæ su-
am esse curandi rationem, quo fit vt
nunc ad neruorum, ligamentorum,
tum deniq; ossium omnium curatio-
nem opportunè flectatur oratio. nā
ea processit methodo negotium, vt
primū de vulnere cutis, secundo
carnis, tertio venarum, arteriarum,
ac pulmonum, quartò autem, (sem-
per ad profundiores filum ducendo
minúsq; oculis expositas parteis) ner-
uorum, postea tendinum, ligamento-
rumque, tum postremo ossium quæ
sunt velut corporis basis aut fulcrū,
disceptaretur. Quare ordiendum est Differens
hoc libro à neruorum solutione, quæ tūc vlce-
fit punctura, diuisione in lōgum, aut ris neruo
transuersim, contusionēq; Punctura rum.

PERIOCHES VI.

autem fit aut ab aīali, vti scorpīo, aut
 stilō corporeve acuto. Sed quoniam
 hic causſæ nō inquirūtur, ad curandā
 nerui pūcturam methodo peruenien-
 dum est. Primo enim accedat quispi-
 am cui tantum puncta sit cutis acu.
 si etenim is sit cui vlcera facile coa-
 lescent, citra vllius medicaminis opē
 curabitur: sin cui ægre sanantur, pri-
 mū quidē dolebit, pōst etiam tū pul-
 su, tū phlegmone infestabitur. vnde
 nobis est cognoscēda egrī natura, que
 ex notis boni malīq; succi habet. Pre-
 terea de ijs qui acris hebetisq; sunt
 sensus, tū plenitudine grauatis, mo-
 dicēque se in succis habentibus, non
 ignari quōd qui vel plethoricus est,
 vel vitiosis succis premitur, vel acris
 est sensus, vel horū quibusdam, om-
 nibusve premitur, phlegmone ten-
 tabitur: qui contrā est affectus, nihil
 mali sentiet. atq; hæc prospicientes
 non enāma medicamēta ponemus,
 imò blandum & molle, & quod do-
 lorem sedet. nam vbi magna est diui-
 sio, siccantibus remedijs labra vnien-
 da sunt: vbi autem acu stilōve facta

est solutio, duntaxat curādum est ne
 phlegmone particula tentetur. Qua
 re scire duntaxat quid faciundum sit
 nō magna res est, qđ putabat Thes
 salus, sed quibus rationibus quidpiā
 fiat, id vero scire artificiū est. Quip
 pe, vt semel est dictū, non sufficit in
 telligere vlcus indicare vnitionē, sed
 quibus præsidijs, & quo pacto ijs sit
 vtendum, est similiter cognoscendū.
 nam quando dudum quispiam stilo
 in manu punctus foret, ita vt tota di
 uisa cute aliquid neruorum qui sub
 erāt pungeretur, Thessalus principio
 emplastrum adposuit quo vti fuerat
 solitus in magnis vlceribus, vnde
 phlegmone oborta, ad cataplasma
 quod ex farina tritici cōponitur, nē
 pe relaxās & pus mouens, se cōtulit,
 atq; interim hominē tabefaciens in
 tra septimum diem iugulauit. Qua
 propter alia est ineūda methodus ad
 curādos neruos, sumpta indicatione
 ab eorum natura, & temperamento.

De nerui puncti curatione.

Quoniam neruus sensus acumi
 ne pręditus dolorē, dum pū

PERIOCHE VI.

gitur, facile recipit vehementē, quē
sæpe phlegmone consequitur, opor-
tet vti medicamento dolorem sedā-
te, & phlegmonen prohibēte. Qua-
re cutis vulnus apertum inglutina-
tūmq; seruandum est, vt saniei, quæ
hinc oritur, pateat exitus: totum au-
tem corpus superuacuis humoribus
est vacuandum, ac ne dolor quispiā
partem vrgeat vulneratam, sollicitu-
do est habenda. sunt autem medica-
menta non pauca, quæ & dolorē ar-
ceant, & cutis oras diductas seruēt.
Tutius fuerit autem cutim latius in-
cidere, ac sanguinis missione corpus
(si valeant vires) inanire, si autem ca-
cochymia adest, eam ipsam purgare.

Vnde ner Cum autem nerui substantia ex res-
ui substā frigerata concretāq; humidiorē ma-
tia. teria cōdita sit, ab ijs quę simul calfa-
ciunt & humectant, resoluitur ac pu-
trefcit. Quare aqua calida erit omni-
no neruis inimica, atq; pus mouētia
omnia, oleum autem calēs vetus ac
tenue amicum ad fatus. Pharmacū
ergo ad eam puncturam esto tenue,
modice calfaciēs, & admodū siccās,

citra tamen dolorem, nam id solum
 ex profundo saniē trahit. Vtilis pri-
 mum erit terebinthina per se quidē
 in molliculis corporibus: cū euphor-
 bio vero, in durioribus. sagapenum
 etiam, propolis, opopanax, assa, sul-
 phur nōdum ignem expertum cum
 oleo, adhuc calx sapius per æstatem
 in mari lota, ac alia plurima, quæ ex
 libris de simplicibus sunt petēda, ijs
 neruorum pūcturis plurimum pro-
 desse credūtur. Nam lixiuium quoq;
 stillatitiū ad id bene facit, quod pro-
 bauit Galenus in iuvene quē Thessa-
 lius quidā pene putrem effecerat ca-
 taplasmatibus maturantibus, cum ce-
 perit lixiuium (nil enim aliud ad ma-
 num habuit) vnā in ipso farinā hor-
 deaceam ac eruinam concoquens, ac
 ita vulnus adfouens hominem ab ea
 putrefactione vindicauit. ex ijs autē
 quæ Galenus inuenit est id quod dicitur
 εὐφορβία libro tertio de pharmacorū
 miscella componit. quo certe si quis
 opportunē ad hos affectus vtatur, mi-
 rificā percipiet vtilitatē. quod ideo
 dico quia pro diuersis corporū tem-

Simpli-
 cia ijs af-
 fectibus
 accōmo-
 da.

PERIOCHE VI.

peramentis, est quantitas euphorbij
Medica augenda vel imminuenda, exemplo
mentū de illius medici apud Gal. qui eo medi-
euphor camine ad multos fuerat vsus cōmo-
bio. de, sed adolescenti qui erat corpore

magis indurato, non profuit, quoniā
Nil ma quantitati euphorbij detraxerat: qd,
gnum est posteaquam adiunxisset ex eo modis
quod me cum, probauit hominis sanitas. Com-
dicamen ponitur autem hoc medicamentum
tū pręsta eo tertio libro ex parte vna euphor-
re possit, bij, tribus propoleos, quatuor vero
nisi eo de olei veteris. Sexto vero commentas-
xtre vta rio methodi ex cerę parte vna, tere-
mur. binthinę & picis vtriusque ynus di-
midium, euphorbij vero tantum mi-
scetur quātum & corporis & partis
temperies indicat. tamen hoc in loco
Galenus miscet partem duodecimā
ad pondus cerę. Verum hæc ad alios
libros spectant: hic autem methodū
qua commode ijs ipsis vtamur, tra-
dere propositum est.

De neruo rectā cæso, eiusque
curandi ratione.

N Eruo per directū vulnerato, ac
præ nimia cutis ad apertiōe, des

nudato, nullum iam memoratorum
 medicaminū quæ ex euphorbio, aut
 similiter acribus fiūt, admouebitur.
 nudatus enim non feret eorum vim,
 quemadmodum punctus, cum inter
 posita cutis erat, pertulit. Siquidem
 neruo sic nudato omnis curatiōis cō
 silium huc dirigendum est, vt minis
 ma cum rosione sicces. Possunt vero
 id præstare plane paucissima medica
 mēta. Estō igitur hoc casu calx æsta
 te aqua salubri frequenter lota ac cū
 multo oleo soluta. Estō præterea pō
 pholyx elotus, veluti est in eo phar
 maco quod Galenus *διὰ τομφολύγος*
 nominat, in quo elota plurima sunt.
 Quippe quæ ex metallis consistunt,
 ea lota omnia esse oportet, si modo
 citra rosionem vllam sint exiccatur
 ra: quinetiam ceram ac terebinthi
 nam lotam esse oportet. nam omnia
 dum lauantur acrem & mordacē na
 turam magna ex parte in aquā qua
 abluūtur deponūt. Si vero robustus
 sit qui vulnus accepit, & cui corpus
 à superfluis humoribus sit vacuum,
 in hoc fas est etiam nonnullis valen
 i. ij.

Ablutio
 nis medi
 caminū
 vsus.

Historia. tioribus remedijs vti. Quemadmo-
dum est Galenus vsus in iuvene phi-
losophiæ studioso qui erat bono cor-
poris habitu, & in æstiuo sole peru-
sus, acceperat autem vulnus in me-
dio brachij manûsq; articulo, cui pa-
stillos ex Polyida authore sapa solu-
tos adposuit, quos tamen exceperant
tepentes linamenta, quoniam in pri-
mis cauendum est, ne quid ex ijs fri-
gidum nervos contingat, quâdoqui-
Frigidū dem pars ea sensibilis est admodū, ce-
neruis ini rebro continua, temperamentūq; fri-
micum. gida, vnde facile à frigido læditur, &
suum affectum cerebro impertitur.
Postquam vero admouit vlceri hoc
medicamētum, quæ circa axillas, col-
lum, caputq; eius erant, oleo calente
assidue madefecit: detraxit tamen il-
li statim primo die sanguinem, atq;
ita intra septimum diem est persana-
tus. Vlcus autem tale oleo perfundē-
dum non est, præsertim cum illis pa-
stillis curatio suscipitur, quibus om-
nino idipsum aduersatur: quod etiā
vlcus sordidum reddit. Neque enim
parum interest nudo ne nervo oleū,

THE RAPETICES. 67

an per interpositā cutim admouēas.

Abluēda præterea est sanies lana vi Abluēda
no tepido intincta. quod si omnia be nerui sa
ne succedant, commode vulnus pote nies.

ris vino dulci, non autem mordaci
ma defacere. eo autem pene ad cicā
tricem ducto, etiam vtile fuerit al
bum, tenue, & quod græci oligopho
ron vocāt: aquam autem semper vi
tabis, sicuti etiam cataplasma rela
xans. Sed quoniam aliquando ad ma
num non habemus Polyidæ trochis
scos, nobis erit vtendum medicamis
ne quod δια χαλκίτεως Galenus vocat
primo de componēdis pharmacis li
bro, hūc in modū descriptum: R. as
dipis veteris vncias duas semis, ar
genti spumæ, olei veteris, ana vncias
tres, chalcitidis vncias quatuor: mis
ceantur, vt par est. Pastilli autē Po
lyidæ ex quinto libro de eorū quoq
pharmacorū miscella sic habent: R.
aluminis fissi drachmam vnam, thu
ris, myrrhæ, ana scrupulos quatuor,
chalcanthi scrupulos duos, citinorū,
aloes, ana drachmas duas semis, fel
lis taurini vnciam semis: formentur

i. iij.

Pastilli
Polyidæ.

PERIOCHE VI.

trochisci, qui (dū est opus) vino soluantur aultero. Si vero horum copia non est, Andronis vel Pasionis, vel etiā Galeni pastillus erit sumendus. quorum etiam eodem quinto libro compositionem habes. Ista autē omnia vera methodus inuenit, quę postea longa experientia confirmauit.

De neruo transuersim cæso.

Neruus transuersim cæsus. maius periculum conuulsionis adfert, phlegmone scilicet à fibris sectis ad infectas distributa, cæterum conuulsione ab infectis excitata. hoc autem vulnus haud aliter curādum est, atq; alterū. Sed detrahere sanguinem liberalius, ac minus nutrire decet: hominē etiam in quiete ac molli lectulo continere oportet, tum oleo vberatim in axillis, collo, tendinibus, ligamentis & capite vti: quod si neruus cruris sit vulneratus, sicuti cū in manu erat, alæ, ita in ijs bubones largo oleo sunt imbuendi: tum per totam spinam ad collum & caput ascendendum est.

De nervorum contusione.

Nervorum contusionem promiscuā habere generationē cum ecchymosi seu carniū contusione facile infinuat similis vtriusq; curatio. nā illic digerebamus & adstringebamus: hic vero etiam siccandum & adstringendum est, præsertim dū cutis vnā cum nervo contusa exulceratāq; est. Si vero absq; cutis simili affectu est contusus, hunc oleo digerēte sēpissime perfundere oportet, ac totius corporis similem curā habere. Verū hoc raro incidit, nervos autem cum cute sēpe contundi videm⁹, vnde Athletæ ipso vsu edocti habent cataplasma quod ex oxymelite & fabacea farina conficitur, quod plane salutare est medicamentum. At si dolor vnā cum contusione vexat, etiā picem liquidam immiscere ac bene concoquere, tum calens medicamentū imponere oportet. Si magis ipsum siccans efficere voles, ervinam indes farinā: si vero magis siccās desiderabis, Irim quoque immittes. Totius præterea cor

i.iiij.

PERIOCHE VI.

poris cura his quoque cōmunis est. At si totus præcisus nervus sit, meatus præterea nullus est: imbecilla tamen particula manebit. Curatio vero eius cōis est cū ea, quæ est aliorū vlcerū, quāmq̃ vnā Thessali imitatores norūt. Ergo de nervis hæc abū de dicta sint, postea autē docebitur de phlegmonis quæ eis supveniūt.

De ligamentorum ac tendinum exulceratione.

Ligamenta valentissimorum re-
mediorū vim tolerare ideo cre-
duntur, quòd & sensus expertia sint,
& quòd ad cerebrū non pertingant.
Nervi enim omnes alij ex ipso cere-
bro ortum habent, alij spinali inter-
ueniente medulla. Tendones autem
ex nervo ligamentoque substātiā
habent, vnde minus conuulsionē ac-
cerunt quā nervi. Ligamēta vero
ex osse ortum habent, quorum rotū-
da quædam sunt, alia autem lata, vti
sunt tendones. rotunda siquidē ner-
vis similia sunt, præterea albedine,
cavitatis & sanguinis priuatione, ac
postremo in fibras diuisione distin-

qui omnino nō possūt, sed sola duritate positūq; differunt. Si is itaq; syndesmus, id est ligamentū, sit vulneratus qui ab osse ad os permeat, & maxime sine periculo est, & qui ferat quantūvis siccātia medicamēta: Sin is qui in musculū se inserit, quāto est nervo & tēdone minus periculo opportunus, tātō vtiq; nisi rite curetur, reliquis syndesmis magis terrere debet. Quare qui partis naturam ignorāt, & ab ea indicationē sumēdā esse negāt, nulla ratione methodo curare possunt. Nec in omnib⁹ supradictis duntaxat partib⁹ id rationabile est, verū etiā in abdomine eiūsq; partibus de quib⁹ iam nobis dicēdū est.

De abdominis vulnere, ac curatione.

ABdomē, quod Græci epigastriū non vocāt, cōponitur ex gemina cute, adiposa natura, neruea geminaq; tenuitate, quæ musculis attestat, quam nostri sectores laborem in ea peruestiganda fugitātes ignorant. ijs autē succedunt musculi duo recti & in totum carnosī, hos statim

Abdominis compositio.

PERIOCHE VI.

sequuntur obliqui quatuor, quos de-
 mum excipiunt duo trāuersi in ner-
 uosam finiētes mēbranā peritonæo
 finitimam. Peritonæū autem abdo-
 men non cōstituit, vti nec epiploon.
 est enim illud, corpus simplex quod
 circūponitur intestinis. Quare dum
 vulnus est in medio abdomine, lōge
 periculosius existit q̄ si fuerit ad la-
 tus decliue, vbi est magis carnea na-
 tura ob musculos carnosos illinc or-
 tos. duplici enim de caussa difficile
 est vuln⁹ medij epigastrij, tum quòd
 mēbranosum sit, & tenue, vnde vix
 futura administratur: tum quòd hac
 parte maxime procidāt intestina, &
 ægre inibi contineri queant, quādo
 quidem muscoli recti secti sunt, illi
 autē qui ad latus, constringūt. Quo
 circa si magnū est vulnus, multa ex-
 cidunt, quæ hac ratione vix reponū-
 tur. Si autē paruum & angustū, rur-
 sus periculosum est, quoniā nisi illis
 coquod procidit intestinū in locum
 suum reponas, inflatur, vnde per an-
 gustū foramen immitti non potest.
 Ad hoc itaq; vulnus curādum qua-

tuor ordine proponuntur. Primo in Quatuor
testina in suum locum recedenda. Secundo adcurandum
cundo vulnus suendum. Tertio me abdominis
dicamen admouendum est. Quarto nis vulnus
autem ne pars insignis simul afficiatur necessa-
tur est providendum. Primum itaque tra-
ctandum in vlcere paruo. Nam si in Primū.
testinum intumuit, aut erit tumor abi-
gendus, quod prestantius est, vel au-
gendum vulnus. tumor facile cedit
discusso spiritu, qui causam habuit
frigiditatem aeris, ergo remedium
erit petendum a calidis. Spōgia itaque
mollis calenti aqua madens, & ex-
pressa, intestino frequenter admota,
aut quidpiam viribus simile, vt vinum
austerum cataplasmatumque varia, facie-
le id prestabit. Si vero tumor hic non
cesserit, vulnus leuiter in augendum
erit, ac tandem corpus in partem vul-
neri contrariam inclinandum. Secundum
quod proponebatur, futura fuerat:
que non debet administrari duriori,
ne lædat: aut molliori, ne rumpatur,
funiculo aut filo. Incipiendumque a cu-
te abdominis ac ducenda ac erit usque
ad peritonæum, cuius pars contraria

Secundum

PERIOCHE VI.

excipienda est, atq; redeundū in partem abdominis oppositam, sed ita ut simul peritonæi secti labrum alterum non omittas. Atq; ita faciendū donec totum vuln⁹ assutum fuerit. Hic autem est modus suendi Galeni libro sexto methodi, sed quia frequēter suo more id consuunt nostrę ætatis chirurgi, consulerē, ut quod sola contēplatione de hac re traditur, actione & experientia cōprobaretur. quoniam facilius multo rem totam

Tertium. excipiemus. Tertiū horum erat medicamentum quod adponi vulneribus abdominis debet: erit autem illud eiusedē materiæ cū ijs quæ enæma hoc est sanguinem supprimētia

Quartū. dicuntur. Quarta autem curationis pars nō paulo ab alijs dissidet. siquidem quod inter inguina axillāsque est, id totum molli lana ex oleo mediocriter calente imbuta circundare oportet. Satius item fuerit & si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Quod si quid ipsorum intestinorum sit vulneratū, quæ extrinsecus fieri debēt, ōnia similiter sunt

peragenda. Cæterum vinum nigrū,
 austerū, tepensq; injiciendum erit, si
 præsertim in totum sit perforatum.
 Crassa siquidem intestina facile, te-
 nuia autem, vt est ieiunum, ægre cu-
 rantur. Ventriculi etiam partes infe-
 riores carnosæ facilius quàm gula
 aut stomachus propter medicamēti
 appositionē coalescere possunt. Sed
 de ventriculi vulnerati aliorūque
 exitialium vulnerū sanatione Hipp.
 docuit abunde, quod ab ipso peti sa-
 tius est, ac ita ad ossium vulnera ora-
 tio deflectetur, si prius adnotaueris-
 mus, epiploon quod peritonēi sequi-
 tur vulnus, dum nigricat, esse vincu-
 lis comprehendendum, ac quod de-
 niq; alteratum est abscindēdū, quod
 fecit quoq; Gal. in quodā gladiatore
 vt refert libro de partiū vsu quarto.
 Sed vinculi finis pēdeat curabimus,
 quo nimirū facile eum cū ex vulne-
 re suppurāte euometur recipiamus.

De fracturarū ossis differentia,
 & curatione in vniuersum.

Proximū fuerit tradita carnis, ve-
 narum, arteriarum, pulmonis, ar-

PERIOCHE VI.

ticularū, neruorū, ac postremo abdo-
 minis vitiorū curādorū ratione, etiā
 de ossium solutione sermonem insti-
 tuere. hæc fit autem aut à violentia
 quadam externa, aut interna erosio.
 Ossis fracti differe-
 tiā cōstituere possum⁹. quarū prima
 rētia quī est per transuersum, græci *ἐκφρασις* ὀσ-
 tūplex. vocant, quōd nō secus ac raphanus,
 transuersim rumpatur. Secunda est
 per longitudinem, cum tamen sic af-
 fracti ossis partes omnino separātur.
 Tertia est oblonga ossis fissura quasi
 assuke modo facta, quæ schidacidon
 græcis dicitur. Quarta est contusio
 facta à corpore duro obtusōq;. Quī-
 ta denique est caries quæ fit ex vitio
 humoris sensim depopulantis humi-
 ditatem eam quæ conglutinat par-
 tes solidas. ac ab ijs differētijs, quid-
 piam desumi ad curationem singu-
 larum potest, vt seorsum monstrabi-
 tur. Si prius intellexeris, quoniā fra-
 cti ossis soluta partiū vnitas est, vtis
 q; finē esse in curatione primū, vni-
 tionem. Sed quia præ siccitate in ad-
 ultis siccisq; animalibus nunquā per

se, in puerulis autem ac molliculis aliquādo id fieri potest, restat vt interuentu cuiusdam substantiæ glutinetur, quæ si nec ipsa comparabilis aduertitur, insanabile esse vitium dixeris, verum interuenit ea substantia quoniam omnis particula sibi familiarare trahit alimētum, os autē crassius ac terrenū magis quā aliud quoduis alimentum fugit, vnde quod ex hoc ipso redūdat, & in labris fracturæ concrescit, suo ipsius interuētū ossis extrema glutinat, estque illud quod adnascitur, callus, qui mediocritatē in crassitie, & tenuitate, duritie etiā ac mollitie seruet oportet, ad quod tunc victus ratio tibi proponitur: de nouo obseruandū est tempus quo hic ipse callus sit pignendus. Age igitur ac videamus quæ agēda sunt in vnaquaq; fracturæ differētia, vt curationem tādē assequamur, ac ita primo de ea quā raphanidon vocāt, dicat.

De curatione ossis fracti secundum transuersum.

Quoniam in hac fracti ossis differentia partes sic à se dissio-

PERIOCHE VI.

dent vt è directo non iaceāt: clarum
est primum id esse agēdum, vt in di
Figura re rectum agantur. directum autem di
cta mem cimus quum in figuram pristinā na
brorum turalēmque reducuntur. nam ea ma
quæ est. xime tuta est ne dimoueat post re
ductionem, ac ab omni dolore longe
aliena, vt est monstratū libris de mu
sculorum motu. brachij siquidem
figura esto angulosa, vt cruris, quæ
paulominus porrecta sit. Cæterum
non modo ad vitandum dolorē, na
turalis habitus cuius instrumento est
utilis: verumetiam consuetudo quo
que conducere non nihil videtur: atq;
hæc quidem figuræ, in qua membrū
custodire conueniat, inueniendæ est
ratio, in partiūmq; reductione ad se
quam antistasin vocant: cum præter
ea in naturalem situm aptantur fra
cti ossis particulæ, quæ dum adducū
tur motu cōtrario, periculum est ne
quæ earum extantiæ frangantur. nō
enim veluti ī ferra dissectis, leuis est
vtriusq; partis finis. Nam si illæ fran
gantur, non poterunt adamussim se
cum coaptari fracti ossis fines, tum

quia forsan fragmēta inter partes vniendas interciderint, tum etiam quod quidpiam ossium forte extra ceciderit, vnde spatia maneant inania, in quę sanies collecta, atque tēpore putrescens, totum pariter membrum secum corrūpet. Atque ob hęc quidem quę dissident ossa è directo admota esse oportet. quod cōmode certe fieri nequit, nisi retrorsum prius retracta fuerint. id autem fit manibus, dum paruum est membrum: sin maius, aut vinculis īpositis, aut vnā cum ijs etiā alijs instrumētis. postea vero vbi iam nullus superfit metus ne se in adducendo tanguant, tum in directum opponere, vinculaque relaxare, ac musculis ipsis diductorū in idem commissionem permittere: interim vero te ipsum quoque manibus subservire, ac sicubi aliquid paulum subsultet, corrigere atq; formare expedit. His rite peractis omni studio laborandum est, vt os immotū permaneat, atq; ita tuta deligatura operit, non quidem laxa, ne satis arctet ossis fracti partes: non rursus vehemē-

De ossiū
deligatura.

k.j.

PERIOCHE VI.

mentiori, ne dolorē excitet: sed quæ
vtrunque excessum declinet. Fascia
vtiq; latissima commodior erit mē-
bris æqualis crassitudinis. Verum
cum id non sit sæpius, id quod deest
nobis de fasciarum latitudine, circui-
tum numero pensabimus. Ea autē
deligatura ducenda est ab ipsa offis
fractura versus sanam partem, cum
si aliter feceris, succum ab alijs par-
tibus in affectum traduces: ac ita de-
mum phlegmone excitabitur, quæ in
hac re in primis erat arcenda, quan-
uis difficile id sit quū ob ipsam vul-
sionem dum in directum ossa agerē-
tur, tum maxime ex eo quod causæ
quæ fracturam faciunt, plerumque
circundatam ossibus carnem consti-
pando cōtundēdoq; prius ledūt, vnde
ingentes sequantur phlegmonē. De-
ligaturæ autem ratio sumitur ex ip-
sa rei natura, quū enim duæ sint par-
tes quæ & à particula laborante re-
cipere aliquid, & ad eam trāsmittere
possint, vtq; superiacētes ob mul-
titudinem & magnitudinem ad am-
bo sunt magis habiles, extremæ ve-

ro ob contrarias cōditiones exiguum aliquid recipere vel transmittere possunt. Quare Hippocrates ap-
 pte duas adiecit ligaturas, priorem quidem vt dum sursum duceretur simul & quod in parte cōtineretur, illuc expelleret, tum quod fluxurum erat arceret. Alteram vero deorsum dispensari voluit, eaqueque gemina vtilitate: sed quum non satis stabilis-
 ant ossis fracturā, iussit splenia adijci ad tutelam. ne autem phlegmone oriatur, medicamento quoque ex ijs quæ phlegmonen prohibent, vti censet, quale nimirum est Ceratum humidum. Atq; ad primum quidem opus quod in fracturis ossium mor-
 liendum est, nullum est iam reliquū præceptum.

Hip. de
 ligatura.

Quo tempore soluenda ossium deligatura.

QVoniam multa quæ ad ossium solutam vnionē curandam faciūt tradita iam sunt, nunc videndū est de soluendi ligamenti tēpore, vltūsq; ratione. Hippocra. enim sentētia tertio die solui iubet, ne dolor pru-
 k. ij.

PERIOCHE VI.

ritusve creetur, ac eius quod iam fracturæ infixum est perspiratio prohibeatur. Cuius occasione non modo noxius prurit⁹ quibusdā accidit, sed etiam ex saniei acrimonia cutē erodam exulcerari: ea autem eluenda erit aqua temperate calida. Septima item die à prima idē facies. quo certe tempore apparebunt omnia, si nil impediatur, phlegmone libera, ac gracilia. Quare tūc licebit & ferulas circumponere, & soluere ex maiori intervallo: quandoquidem callus feliciter ita prouenerit, ad cuius generationem cogi concreſcereque aliquid proprii ossium alimentum oportet. qđ certe à fracturę labris eluendum nō est, nec foras euocādum, quod tamē assidua faceret solutio. At vero nec tanto intervallo intermittendum, ut nescias quemadmodum fractura procedat. dum enim sicciora redduntur ossa, callus gigni non potest. quibus tertio aut quarto quoq; die modice aquam calidā infundamus, hāc meatum perfusionis habentes, cum carnes in rubrum tumore attolluntur.

atq; in ijs quidem priusquam subsi-
dere incipiant, desistendum est, con-
trà quàm vbi quidpiam digerere vo-
lumus. Si vero abundantior humidi-
tas impediatur calli generationem, ibi
hanc siccare conuenienti deligatura
& aquæ perfusione, quæ omnino vel
minima sit, vel plurima conabimur.
Quippe minima pri⁹ desistit quàm
aliquid confluat, ac humores qui in
superficie inhærent digerit, quiq; in
alto sunt modice liquat. Expedit au-
tem ita solui & liquari ea quæ per li-
gaturam tandē sunt expellenda. Plu-
rima autē pfusio digerit plus quàm
trahit, atq; ita commodat superflua
humiditati. In ea enī deligatura quæ
exprimit, debent fasciarum fines nō
multum adstringi: in ea vero quæ ad
renutriendum est comparata, nō mi-
nus arctandi sunt, sed laxiores sunt
circumductus omnes. quibus sic ri-
te peractis superest vt de vniuersa
victus ratione eorum præcipiatur. ad
quod intelligendum est in hac ossiū
curatione duo esse tempora diligen-
ter obseruanda: alterum quo phleg⁹
k. iij.

PER IOCHE VI.

De vict^o
ratione.

mone timetur, alterum vbi nullus
iā est ipsi phlegmonē locus, quo ma
xime tēpore callum gigni expedit.
Priori enim tēpore eadem pene est
instituenda victus ratio, quæ phleg
monis aliarum partium comparata
est: nempe tenuis, ac nonnunquā va
cuatione, purgationēq; est opus, sed
de ijs alio loco dicetur. Verum quo
tēpore gignitur callus, est opus bo
ni succi alimentis multūmq; nutriē
tibus, ex quibus provenire solet non
solum bonus, sed tenax: ex quali cer
te callū fieri expedit: ex seroso nāq;
& tenui gigni prorsus nequit, ex
crasso vero, sed fragili pinguedinis
que experti gigni quidem nō segnis
ter poterit. Cæterum tempore sicce
scēs friabilior atq; ita fractioni ob
noxius reddetur. Quantitas autem
calli i magnitudine esto mediocris.
nam qui iusto minor est, ossa parum
reddet tuta: qui maior est, dolorem
musculis inuehet. vtrunq; autem vi
tium corrigitur perfusionis quantis
tate, & qualitate, ciborum etiam, ac
medicamentorū que extrinsecus ad

ponuntur facultate. auget siquidem
callum aut diminuit perfusio & vi-
ctus ratio, quæ nunc exponebatur.
medicamentum autem emplasticum au-
get, digerens vero excedentem im-
minuit. Mediocre autem conser-
uat medicamentum quod cruentis vul-
neribus parari solet, nam modice
siccat, ac coagulari concresecereque me-
diocriter callum facit. Ac de vulne-
ratis transversim nervis hætenus. De
longis vero reliqua omnia ad eun-
dem modum se habent. Cæterum con-
primendæ hæ magis in ipso fractu-
ræ loco sunt, tum quod recessit re-
trudendum introrsus est, quare ad ter-
tiam speciem ossis fracti est acce-
dendum.

De ossium contusione.
QUæ multifariam confracta sunt
ossa potissimum cum vlcere,
ut plerunque fieri solet, ijs splenium
circundandum ascie seu dolabræ mo-
do incuruum Hip. præcepit: illudque
vino imbutum tum nigro, tum auste-
ro, æstate potissimum. Hoc enim ma-
gis quam reliqua ossium vitia, quod
k. iiii.

PERIOCHE VI.

maius sit, siccarī postulat. quare me-
dicamētis est vtendum non quidem
extremē, sed vt sunt enæmia, siccanti-
bus. quibus certe dum principio quis
vtitur, liquida insit forma vt imbui
facile possint expedit. Ac reliqua il-
lius præcepta sunt peragēda. adhæc
aliquando nudatū os ferra defecari,
aliquādo fragmenta eximi arte, vel
natura expelli est opus: sed nunc de
deligaturis dicatur, hæ enim pro di-
uersis partibus variam quoq; habēt
rationem, veluti instrumenta quoq;
quibus Hip. suis tēporibus est vsus.
is enim ad firmādum os cruris post
deligaturam vtilēs putauit solenas.
Sunt autem thecæ reliquiarū ligneæ
quibus os aliquod circumligatū cō-
prehenditur, tutūmq; ad motiones
redditur: alterum est instrumentum
quod glossocomion vocant, quo ma-
xime est vtendū quando callus pro-
gignitur. est autem in summo latius.
declinans ad angustiam in linguæ si-
militudinem, vnde nomen traductū
est. Verum omnia connumerasse in-
strumenta quibus est vsus Hip. faci-

le est: sed ea in vsum cōmuniter praxim ducentium adferre pene est impossibile. sua enim est cuiq; genti instrumentorum ratio, vt mox ostendatur vbi de capitis fractura docebitur. Id tamen omnibus est obseruandum, vt eligatur ad id instrumētum & quod ossa firmet, & quod illis doloris nihil inuehat.

De capitis vulnerum differentiis ac curatione.

Cerebri tegmē, quod *ἡράνιον* grecis, caluaria latinis dicitur, ideo compositum est ex multis ossibus, vt si quando percussum rumpatur, ne in id totum fracturæ eius procedāt, De partibus sed detineātur illis in partibus & cesum vsum, sent, in quibus ipsum quoq; os per nono. cussum cessat. vnde sūt variæ fracturarum capitis species, quas Paulus Ægineta libro sexto in senarium reduxit numerū, quæ ita habēt: Rhogme, id est fissio: eccope, hoc est excisio: Fractura: ecpiēsma, quod est effractio: enrum caligisoma, id est corporum ob vehemē uariæ ditem ictum appropinquatio: camaro ferentia: sis, hoc est testudinatio. Sexto thlas

PERIOCHE VI.

sis infantibus quæ proprie fractura
 non est, sed ossis caluariæ introrsum
 impulsio, vnde manet cōcauitas, quæ
 admodum fit in plumbo aut stagno.
 Atq; ita in totum sex sunt illæ spe-
 cies, quibus singulis est sua curandi
 propria ratio, quāquā omnibus vna
 communis sit methodus, quod intel-
 ligetur ex curatione vulneris quod
 rhogme dicitur. potest enim primā
 duntaxat ossis laminā pertigisse, vel
 etiam alterā vsq; ad duram menyn-
 gem. in vtroq; autem sic curatio ad-
 ministrabitur: derafo super vulnus
 capite duas lineas iuxta rectos angu-
 los mutuo se secātes quæ literæ X fi-
 guram accipiāt, incides (harum au-
 tem alteram esse conuenit quæ iam
 præcessit) deinde quatuor angulos in
 vertice excorians, vt os læsum nudū
 appareat (sanguis autem si fluat lina-
 mento ex posca aut simili quopiā ar-
 cebitur) postridie si nullum vetuerit
 symptoma, perforare os vitiatū te-
 rebella (quā galli trepennam vocāt)
 conaberis, aut scalpello primo latif-
 simo, (si vulnus ad secundam dunta-

Paulus li
 bro sexto

xat laminam penetrarit) secūdo an-
 gustiore, quod est excisū leuabitur.
 Post hæc tum protinus, tum ad finē
 ficcis erit vtendū medicamētis, quæ
 ob id ipsum quod ijs affectibus suc-
 curreant cephalica, id est, capitalia vo **Cephalicæ**
 cantur. ea componūtur ex iri, erui fa **ca medi-**
 rina, manna thuris, aristolochia, pa **camenta.**
 naces radicis cortice: ac in summa
 omnibus quæ citra erosionē siccāt,
 quorū materiā liber de simplicibus
 medicamētis, compositionem vero
 liber de pharmacorū mixtura abun-
 de suppeditat, maxime secūdus com-
 mentarius, vbi promiscuè & catage-
 matica, id est ossibus medētia, ac ce-
 phalica describuntur.

De curatione fracturarum & cō-
 tusionum cranij, ac quibus in ea
 ipsa instrumentis vtendum.

HActenus de ijs quæ communia
 sunt ad carnem producendam
 in fracturis omnibus: nunc vero de
 simplicibus fracturis ad cerebri vsq;
 membranas peruenientib⁹ agendū,
 quibus scalpellum angustū adhiben-
 dum est: sin cum contusione aliqua,

PERIOCHE VI.

id quod est cōtufum terebellis quas
Trepennas prius vocauimus excidi
debet. verum nō nisi periculose ad-
mouentur. Nam duram membranā
quæ ossi substernitur sæpe violant,
caputq; quatiūt, quod omnino dum
curatur quietem postulat. Horū au-
tem terebellorum descriptionem &
formā nouerūt etiam vulgares chi-
rurgi, at cycliscos Hippo. nostra ætas
non dignouit, omnes enim pro ar-
bitrio varijs in curanda ossium tum
cranijs tum aliarum partium contu-
sione vtuntur instrumentis, quorum
optimam partem ad viuum depictā
inuenias in illo recenti Guidone chi-
rurgo. quare illuc te conferas licet,
quoniam hic curationem non autē
instrumentū tractare expedit. Quod
enim vehementer cōfractum est, id
totū auferri debet: si vero ab eo fra-
gmenta quædam longius excurrāt,
hæc ad finē persequi non licet: quo-
niam nihil ex eo noxæ sequetur, si
reliqua omnia rite sint peracta. Cæ-
terum in alijs partium fracturis ad
arcendas phlegmonas humorisq; as-

fluxum deligaturis esse vtendū iam
 est monstratū. Sed eas capiti adapta
 re omnino nequeas, quare nec quod
 affluit reprimi, nec quod iā est col
 lectū exprimi valet: sine quib⁹ præs
 fidijs nec reliquorum ossium vllum
 seruari potest. Quomodo ergo ne
 hæc in capite accidant, quod ligatur
 ras nō admittit, & sanies prona fer
 tur, sic vt super mēbranam duram
 vniuersa coaceruetur inhibendū est,
 paucis aduerte. Aliquid fracturæ
 primū nudabis quò saniem deter
 gere & abluere à membrana liceat,
 cū vero nihil amplius de phlegmos
 ne timebitur, omniāq; sicca ad vñ
 guemerūt, carnem producere ac lo
 cum cicatrice obducere conueniet.
 Verum, vt in reliquis alijs, ad curas
 tionem haud mediocriter partis es
 sentia, situs, & vicinia cranijs cōferūt,
 quod hoc vno Galeni exemplo facie
 le intelligas, os enim sincipitis fra
 ctum hac ratione curauit, supernū
 os excidit, quanquā id quod est à la
 teribus prius eximēdum cogitasset
 quo sanies promptius deflueret: sed

Curatur
 cranium
 fractum.

PERIOCHE VI.

cum meminisset hoc spissum ac ita
 durum vt petrosum appelletur non
 posse abscindi, nisi valenter concuso
 cerebro, atq; eo ipso in illa parte
 exciso, cerebrum quod illi fortiter
 innititur promineret, tum præterea
 quod illic sit nervorū non levis qui-
 dem momenti exortus, in supernis
 vero capitis partibus ne minimus
 quidem oriatur, præstare saniē quæ
 aliter siccare possit in membranam
 prolabi, quàm cerebrum tam valen-
 ter cōcuti putavit. Postq̃ vero est os
 perforatū, omni curato diligentia vt
 pharmaca vehementissime siccantia
 parti admoueantur. quorū copiā ha-
 bes non modicā in libris de eorū mi-
 scella, ac Scribonio Largo, vnde vnū
 in tertiā periochē traduximus, quo
 Meges Sydonius chirurgus feliciter
 utebatur: ea enim nudatæ membra-
 næ, & super hanc oxymeli imponū-
 tur, nam sibi cum sit essentiam for-
 tita siccam hæc particula, profecto
 nihil miri est si antequā phlegmone
 occupetur, valenter siccantibus gau-
 deat medicamētis. Cæterum hic flo-

nienda est de morbi cōmunis cura-
tione disceptatio, sequenti vero pe-
rioche similem affectū vnius ven-
triculi exemplo ex Gale. sanabimus.

Finis sextæ Perioches.

PERIOCHE SEPTIMI COM-
mentarij Therapeutices Galeni.

Omnis intemperiei curandæ ratio
generatim mēbratimq; traditur.

Quemadmodum communis
morbus seu vnitatis diuor-
tium methodo curetur, su-
periora ppgymnasma
ta satifecerint. Quare proximū est **Propositi-
um.**
vt ratio curandæ omnis intemperiei
totū corpus, vel quāuis particulam
occupantis, pari quoq; studio trada-
tur. Atq; vt omnia clare dignoscan-
tur, initium à ventriculo sicco desu-
metur, tandēmq; ad reliquas intem-
peraturas tum puras, tum ex humo-
ris vitio cōstantes deducetur oratio:
quę rursus in suas differentias distri-

PERIOCHE VII.

Partium butæ, suā quæq; curādi rationem ha-
similariū bent. Hic autem morbus, vt antea di-
morbis ctum erat, est partium similarium.
intempe- Nam cū earum essentia ex calidi, fri-
ries. gidi, humidi, sicciq; symmetria pfi-
stat, necessum est morbum earūdem
esse ametriam, seu incōcinnam tem-
periem. vnde & hic denuo elemēto-
rum cognitio nobis est postulanda,
alioqui rationem curandi nullatenus
assequi possis. Quis enim, rogo, ven-
triculi aliarūve partium imbecilli-
tatē sanabit, huius vero causam, infi-
gnem intemperaturam perspectam
non habuerit? Rationalium siquidē
nonnulli, dum imbecillitatem partiū
ad actiones naturales obeundas di-

Quid ne cunt, illius autem occasionē non de-
cessariū promūt, nil certe vltra quā sentiat
ad curan- plebeius quidam, mihi sapere viden-
di metho tur, cum eius causam protinus non
dum. subiiciunt. quare si quis recta via cu-
rare velit, debet actionū tum natu-
ralium, tum contra naturam causas
inuestigare. Nam cū pro naturæ mo-
do particula est affecta, ad propriam
actionē non est imbecilla, sed quan-

Therapeutices. 81

do accessit omnino aliqua præter natura occasio, quæ eam dissoluit, deiecitque, & mortuæ similem effecit: quâdoquidem non nouit qui de primis communibûsque elementis exactam cognitionem non habuerit, de quibus hæc sequens tota disputatio absoluetur. ea autem singulis partibus homogeneis vim quâdam ingerant, vnde actiones propriæ omnibus prodeunt, quæ tantum inter se se dissident, quantum vna particula ab alijs quæ eas ædunt operationes est diuersa. Differt autem particula quæq; ab alijs eò quòd calidior, frigidior, humidior, sicciorve sit, aut quòd dentque binis horum quibuslibet sit affecta. Qui enim actionem vult tueri, hic earum temperiem custodienda actionis ratio. stodiât oportet: custodit autem si id quod excedit ad calidum, frigidum, humidum, aut siccum, vel ad horum composita reducens, temperet contrarijs, quoad particulam in symmetriam & naturalem habitum vindicauerit. Ac ita genere quidem omnis ægritudinis quæ in similaribus par-

Vnde naturales facultates.

Custodienda actionis ratio.

l. j.

PERIOCHE VII.

tibus cōsistit, iam dicta mihi medendi methodus videtur. Quæ vero mēbratim agitur medicatio, ex his duobus conficitur : nempe materie copiam, & huius congruo usu. Medicamentorum autem copiam tum ex libro de simplicibus, tum de pharmacorum miscella haurias licebit. eorum autem usum opportunū, ac ea quæ ad victus rationē pertinet, hinc sumes. Sed & quemadmodum morbi cuiusq; intemperiem agnoscere licebit, ex libris de tēperaturis, secundo ex libris de locorum affectorum notitia, deinde ex libro, maxime secundo, qui ars medica inscribitur, intelliges. quæ velut manu ad omnia morborum genera curanda, quemcunq; vel etiam hebetem, deducere possunt, maxime autem eum qui sit exercitatę rationis. Verum quoniam (vt inquit Plato) quæ scribuntur, aliquando in manus eorum deueniunt, qui laborum fugitātes, exempla desiderāt, fore consultū visum est quæpiam particulariū esse adiicienda, ex quibus protinus clare id quod proxi

Ex quib²
locis intē
periei q̄ti
tas digno
sci potest

me dictum est intelligatur. Initium
 (vt ante proposuimus) à ventriculo
 facientes imbecillo, cui empiricus, ac
 qui nulla ratione curat, citra vllam Empiri
 affectuum distinctionē extrinsecus, corū mo
 intrinsecusve amara adstringentiāq; dus curā
 medicamēta parat. vinum siquidem di omnē
 austerum, absynthiū, mali etiam co ventricu
 tonei succum, aliāq; huiusmodi de li imbecil
 uorāda propinat. Extrinsecus autem litatem.
 vētriculum perfundit ex oleo de ab
 synthio, mastichino, melino, tum so
 lis, tum cera permixtis: quibus ali
 quando succedūt epithimata ex mul
 tis aromatis composita, vti est spica
 nardi, calamus aromaticus, iris, lada
 num, malabathri foliū, styrax, bdel
 lium, opobalsamū, xylobalsamum,
 reliquūsq; aromatū catalogus. Quod
 si horum nihil profecisse viderit em
 piricus, tandem commune omnium
 remedium, quibus nocet imbecilli
 tas, adhibet, nempe rubrificationē,
 quæ vel per thapsian, vel sinapi, vel
 tale, aliquid excitatur. Deinde ad v
 sum calidarum aquarū ablegare so
 let. Quippe vltra hæc empirici nihil
 l.ij.

nouerunt. Verum dogmatici ratione
 intellegūt octo esse imbecilli vētricu
 li curationes. Nam sæpenumero vno
 die, vel potius hora, frigida portione
 quosdam leuari vētriculo æstuantēs
 videmus, quibus aquam niue refri
 geratam, aliōsq; ad eūdem modum
 refrigeratos cibos, vti est aphroga
 la, (lactis florem spumamve Roma
 ni vocant) fructus etiam temperatu
 ra frigidos opportune dabimus, sco
 pum vnum nobis proponentes, nem
 pe refrigerium. Si autem calfaciens
 dum fuerit, vinum vetus, cibōsq; fr
 omnes natura calidos, ac deniq; fr
 ctiones instituemus. Quemadmodū
 humidam temperiem corrigemus,
 cibis desiccātibus, portione modica,
 adstringentiūmq; omnium vsu. Sic
 cam vero curabimus contraria om
 nino ratione, ei quam paulo antē tra
 didimus, vbi de empiricorum curan
 di via dicebatur. Veluti Galenus fe
 cerat in eo quem isti susceperant cu
 randum. quam rem, vt omnia cun
 ctis clarius innotescant seorsum ad
 iiciemus.

THERAPEVTICES. 8;

De sicca ventriculi intemperie ob
consumptionē roridæ substantiæ.

IAm expedit particularis materiæ
comparandæ meditationes, per o
cto curandi indicationes cōscribere,
à ventriculo sicco vt ante propositū
est, exordientes. facillime enim cur
ratur alterationes tum frigidæ, tum
calidæ, propterea quod maxime acti
uis qualitatibus corriguntur: Acrius
autem quæ in humido siccoque ha
bentur, quod imbecillis & (vt sic di
cam) magis materialibus qualitatibus
curatio eorum perficitur, potiss
simūq; cum humectandum esse re
quiritur. Calor enim & frigus pene
tempore pari reparatur, tamen secu
ritas impar est. nam frigiditas non
leuem quidē noxam inuehit circū
datis partibus, si plane validæ non
sint. Tempus vero in sicca intemper
rie multo amplius requiritur quam
in reliquis. Quippe quod sanum in Quatuor
sanis est, id sicca intemperies est in siccitatis
aegris: quare etiam insanabilis est, si species.
prorsum consummata fuerit, veluti
quādo partium similarium solida sub

I. iij.

PERIOCHE VII.

stantia reddita est siccior. Altera vero siccitas fit cū liquata est ea quę ex concretione cōstat substantia, vti est adeps & caro. Tertia autem fit siccitas, consumpto humido (vt vocant) influente quod vice roris inanibus spatiolis ad solidorum corporū nutritionem continetur. Quarta postremo ab his siccitas est, ex penuria sanguinis in venulis partium contenti, quę cibo & potu facile curatur. omnium autē ægerrime ea sanatur, quę partium solidarum est consumptum nutrimentū, veluti ea quę est ex consumptione humidi cōnectentis similia membra (quemadmodum iam est dictū) nulla ratione reparari, prorogari autē ab industrio medico potest. Omnibus autem ijs siccitatibus austerorum vsus est maxime contrarius, siue potiones, siue ea cibi sint, siue etiam medicamenta: quippe quę absumāt quod superest humoris naturalis, partim ebibentia, partim exprimentia, partim ad proximas partes extrudentia. Quare ad strictos meatus dilatabis si feliciter curare ve

lis, ac quod in vicinas particulas est
 compulsus, reuelles. Præterea singu-
 las partium similarium humiditate
 propria humectantis nutrimenti ope
 replebis: veluti Galenus fecit in quo-
 dam iuvene cuius venter ac denique
 totum corpus pene iam tabuerat ex
 siccitate, cum in ea contrarietate quæ
 in calido & frigido consistit nullam
 euidenter vincentem haberet inter-
 periem, quare omne dirigendum fu-
 erat consiliū in hac curatione ad hu-
 mectandum, cum ea esset cōsumpta
 torida humiditas qua solidas partes
 nutriri paulo ante dictū est, quæ rur-
 sum vt omnium siccitatum ægerri-
 me curatur, ita quoq; Galenus in hac
 sananda maximam adiunxit diligen-
 tiam, quam huc quoque ex septimo
 Therapeutices libro transueximus.

Historia de ventriculi penè ta-
 befacti curatione.

IVuenis hic macilentus factus, ob
 imbecillem ventris coctionem, nō
 medicamentorum (hic enim erat af-
 fectus ex humidi partes nutrientis
 consumptione, quare potius victus
 l.iiij.

PERIOCHE VII.

Balneum
paratur.

ratio fuit exactior exhibenda, sed re-
rum nō naturalium ad humectatio-
nem deflectētium ope, præsertim ci-
bo, potūq; mediocri, etiam exercitio
vt est lauacrum, aut modica frictio:
præterea somno, & quiete tum ani-
mī, tum corporis, aëris etiam tempe-
rati præparatione feliciter est sanas-
tus. quæ omnia seorsim, ex Galeno ta-
men, ordine adponemus, exordium
à balneo facientes. Domum itaq; pa-
rauit balneo proximam, à qua mane
super linteis in balneū aquæ dulcis
omninōque tepentis intulit, longis-
simēque in eo versari permisit, vt
ita sensim corrugata ex siccitate mē-
bra dilaxarentur, quod temperatæ
aquæ qualitas præstat. calidior autem
seu frigidior, tum stipat, tū corij mo-
do cutem rugosam facit. Simul ta-
men adnotandum est ægros sic affe-
ctos bis aut ter in die, interiectis cir-
citer quatuor horis æquinoctialib⁹,
in lauacrum, aut pluries, si ij balnea-
tione delectētur, esse deducēdos. Ab
Lac pro hoc autem balneo statim asininum
pinatur. lac exhibuit, quod inter omnia la-

Etis genera ob substantiæ tenuitatem
 & citissime nutriat, & minime in vē
 tre & præcordijs immoretur. illud
 autem vti & aliud quoduis recēs ex
 animali emulsum ægro est propinā
 dum: imò si fieri posset, aut ab asī
 na, aut mulieris papilla, ipsi tabescē
 ti sugendum cōsulit Galenus. Nam,
 feminis genitalis ritu, celerrime dū
 propria exilijt vasa mutari solet. Ad
 uertendum quoq; in primis est vt &
 substantia & qualitate sit optimum:
 substantia quidem sit non aquosum
 nimis, veluti nec butyrosus, sed quo
 ad fieri poterit similes habeto par
 teis. Qualitate vero tum dulcissimū,
 tum vt par est lacti, splendēs, ac de
 nique nullam externam qualitatem
 odore gustūve præ se ferat. Quæ om
 nia certe ita fient, si animal idoneis
 alatur nutrimentis, quæ perfecte ab
 eo concoquantur, sitque ætatis flo
 rentis, exercitationib;que admo
 ueatur mediocribus, & pullus, si
 quē lactat, auferatur. verum hæc non
 in totum recensebo, quandoquidem
 tū ijs nostris sæculis ea non addatur

Lac opti
 mum de
 scribitur.

PERIOCHE VII.

in nutriendis animalibus diligentia,
tum fusius ex eo Galeni loco repe-
tere liceat. Satis est enim intellexis-
se his affectibus lac optimum, quale
nunc descriptum est, esse ex usu, tum
per se, tum cui mellis tepidi pauxil-
lulum permiscetur, quod rursum &
Mellis natura ex substantia & qualitate sit optimum,
ponitur. sibi vndique cohærens, & simile,
digito etiam glutinis more, dum
eleuatur, pertinaciter firmatum, in
terram non defluat, ac tandem nec
crassius, nam ita cerosum, nec liqui-
dus, quoniam excrementosum fo-
ret: verum vtriusque excessus mediū
sit oportet. Colore præterea esto fla-
uo, odore suauis, non thymum re-
dolens aut quiduis aliud externum,
gustu postremo acuto iucundoque.
ac ita sane lacti permixtum in vētri-
culo, ipsum glaciari non sinet, quin
imo distributionem per corpus quo-
quouersus accelerabit. Verum hæc-
nus est hic æger lotus, ac lacte mel-
leque altus. quare superest vt hic ad
secundam vsque lauacionem quiescat.
quem modice pinguitérque fricuit

Galenus, lacte tamen quod sumpſeſ. *Æger pin*
rat ad vnguem prius confecto, quod qui friſ
ex ructu, ventrisq; mole facile conij *ctiōe traſ*
citur. Ac ita poſt quanq; lauatiōē *ctatur.*
 hominem ſic affectum vngere anteq;
 ſe veſtiat par eſt: id enim ad renutri
 tionem, vt friſtio, conducit non mo
 dicum. nam ſiue cuiſibet parti cor
 poris temperatam infundas aquam
 calidā, ſiue frices, ſiue laues, ſiue alio
 ter quomodocunq; calfacias, primū
 quidem attollitur corpus, vt inquit
 quoque Hippoc. mox gracile effici
 tur. Ideōq; vbi carne implere quod
 libet corpus ſtudem⁹, id eatenus no
 bis eſt calfaciendum, quādiu intus
 meſcat. Vbi vero digerere & vacua
 re cupimus, eatenus continuandum
 eſt, dū quod intumuit ſubſidat. qua
 re deſiſtendum omnino eſt, dum in
 tumuit, nam carne implēdi præcep
 ſus eſt occaſio. quare diligenter attendē
 dum eſt, ne clam te elabatur propo
 ſitus temporis articulus, nēpe quod
 poſtquam leuiter intumuerit, protis
 nus digeritur. Siue igitur hominem
 extreme gracilem perfrices, ſuffici

PERIOCHE VII.

at tibi rubor: siue laues, satis esto me-
diocris calor. Si quid enim ultra per-
gas, resolues hominem magis quam
nutries. Vngendum vero esse cor-
pus statim à balneo duplici ratione
certum est, tum videlicet ne plus iu-
sto digeratur, sed exigua obstruan-
tur cutis spiracula: tum vt oleū suo
lentore aduersus incōmodum quod
ab aere ambiente cōtingit, veluti sit
munimentum. Ac ita demum vsque
ad secundam lauationem tractādus
est æger: post quam rursus lac, si non
auerfetur, exhibendum: sin aliter, pti-
sanam diligēter coctam, aut alicam
frumentaceāve potionem ptisanę
ritu paratā dabimus. Hinc vbi quis
euerit, ad tertiam lauationem est re-
ducendus æger, aut illico ad coenam.
Cuius edulia, potum ac etiam ordi-
nem & quantitatem adscribere ordi-
natim superest.

De cibo ac potu huius ægotātis.

Panis pu-
rus sub-
igitur.

Panem illi parauit purum, qualis
ille est qui Romanis filigineus,
sincerissimūque, Gręcis semidalites
vocatur, sed in forno, non clibano co-

etum. nam hic parte intima magis,
 ille vero minus coquendo desiccatur,
 vt primo de alimentis monstratum
 est. salis autē ac fermēti habuit quod
 satis esset. Cibus vero instituit cor Cibi præ
 etu facilē, nutriētem, minimēq; glu scribūtur
 tinosum crassūmve generantem ex
 crementū. vti gallinacei sunt testes
 & alæ, passeruli montani, perdices,
 coturnices, turdi, ac denique omnes
 quæ molli sunt carne, & mōtanæ po
 tius quā palustres auiculæ. nam &
 facile coquuntur, & nutriunt, at non
 tam copiose atque suilla caro. quæ
 enim plurimū nutriunt, crassæ sunt
 substantiæ, ac ita ægrius coquuntur,
 calorēque naturalem (qui est om
 nium facultatum author præcipuus)
 requirūt ampliorem. Quare cum is
 in tali affectu penē elanguescat, non
 valenter (quāuis id foret optimum)
 sed parce ac facile nutrientia dabun
 tur. Quale est vinum album, tenue, Vinum
 & aquosum, græci oligophorum vo datur.
 cant, ceterū leuiter adstringēs, quod
 huic ariditati per commodū est. nam
 ab aquę imbecillitate recessit, & vini

PERIOCHE VII.

vinosi (vires enim imbecillas ferit)
 noxam nondum habet. Ætate præ-
 terea nō sit nouellum, quippe ita &
 aquosius & excrementosum magis
 est quàm huic proposito sit ex usu.
 Antiquius vero vt vinosius ita calidius
 quàm par sit. quare illud æuo
 medium esto. verum si tale non ha-
 bueris, ad has metas respiciens, etiā
 mixturā eius cū aqua temperabis,
 quę tamē omni vitio careat quod ex
 eius frigiditate pendet, cuius quidē
 culpa & diutiss. in præcordiis mora-
 tur, flatus gignit & fluctuationes, ro-
 bur ventriculi dissoluit, nec multum
 que com- bur alimento per corpus digerendo cō-
 moda ex- alimento per corpus digerendo cō-
 ponūtur. ducit. Quib⁹ certe noxis vina prius
 memorata ōnino aduersantur. Præ-
 cordia inflata subsidere faciunt, co-
 ctionē caloris mediocritate iuuant,
 anadosin accelerant, boni præterea
 sunt succi, & qui facile⁹ misceātur cū
 ijs quæ in venis & ventriculo conti-
 nentur, vires quoque organorū ad-
 augent, & sudores, vrinas, excremē-
 ta deniq; omnia promouent. Modus
 autē is potionis esto, vt nec in vētris

culo innatet, nec fluctuationis vllius
 sensum inuehat, ciborū vero, vt ne
 quidē grauent ipsum, quod difficile
 quidem fit ob imbecillitatē. Ab hoc
 etiam tensio inflatiōq; præcordiorū
 summopere vitādæ sunt. quòd si ta-
 le quidpiā primo die inciderit, pro
 magnitudine symptomatis ad por-
 tionem detrahendū postridie de ci-
 bo est: sin rite omnia cedant, paulu-
 lum adiiciendum. veluti & in tertio
 die vel demere vel adiungere cōueni-
 et, cum præcedente conferentibus.
 Atq; ita semper omnia pro renutris-
 endi reficiendique ratione, frictionib;
 bus, gestationib;, inambulationib;,
 prout corporis incrementū procedit
 administrare, et iā reliqua omnia p-
 rectoria vocata ratione adiicientis
 bus. Quæ sane genere à pposita ra-
 tione nō differt. Sed in eo q; sub illa
 perinde totum corpus est affectum,
 sicuti sub hac ventriculus. Accidit
 autem sic affici corpus in diuturnis
 potissimū affectibus: vtiq; cum con-
 iuncta cuiusque partis humiditas ex
 qua primum nutritur, propemodū

Conuales **scētis hu** **ius ratio** **viētus.** **Leue nu**
 omnis exhausta iam est: quę etiam si
 omnino absūpta fuerit, regigni mor
 do dicta viētus ratione potest, nō au
 tem ipsa solidarū partiū siccitas, vti
 nec senium corrigitur. Sed nunc par
 est adscribere qua sit in hoc ægroto
 conualescente cibandi ratione vsus.
 Primo enim frequentius & frictio
 nibus & gestationib⁹ quam antē, eū
 sollicitauit, ciborum quoq; & qualita
 tem & quantitātē inauxit, ac ita sen
 sim ad solitam viētus rationem re
 duxit. his tamen eū aut pluries enu
 trivit in die. Sed prius obseruato tē
 poris spatio, vt secūda cibatio prior
 rem exacte coctā exciperet. id autē
 valentiori alimento contingere non
 potest. Quare primo loco leue su
 trimentū mendum non ijs modo, verū etiam
 prius in sanis est: quo videlicet & coquatur
 gerendū. celerrime, & excrementum eius di
 scedat, & vacuus purūsq; ventricu
 lus secundum excipiat. Atq; idcirco
 cœna q̄ prandium liberalior esto, tū
 quia somnus & quies, quę calorē re
 uocant ad præcordia, tum etiam tē
 pus longius naturalem huius admi

THERAPEVTICES. 89

nistratōne excipit. Sed id nostris se-
culis minime obseruatur, quoniā in-
temperantiores simus ac ita crudos
humores multos colligam⁹, qui no-
ctu quiescēdo cōcoqui postulant. vn-
de fit vt medici frequēter multis ce-
nam frugaliorem instituāt, ne vel in-
plethoram vel cacochymiā flectan-
tur. Ad hęc maxime notandū est ne
ita conualescētes illico post coenam
bibant, nisi adeo vehementer sitiant
vt aliunde ariditatis periculum nos
solicitet ad eis tantillū vini exhibē-
dum, donec soletur desideriū. Post-
ea vero q̄ concoxerint nutrimentū,
abunde bibere sunt sinendi. mane ve-
ro si deiecerit aluus, & modice ama-
bulauerit, erit modice quoq; frican-
dus æger, dum corp⁹ incaleat, mox
gestationibus, deinde rursum lauan-
dus, tum etiam fricandus, donec ine-
terim vespera aduehatur, quādo pa-
riter erit nutriendus. Verū quia non
vna omnibus victus species in con-
suetudine est, quoniā alij bis, alij fre-
quentius, aut rarius in die edere so-
lent, præterea hi calidam, illi frigida-

Statim a
coena nō
esse bibē-
dum.

m.j.

PERIOCHE VII.

Ad con- dum bibere assueuerunt:ratione in-
 sueta æ dicante ad ea reducendus est æger,
 grū redu quibus insueuit. Sed de cōsuetudine
 cito. seorsum dicetur, quæ ad totius vi-
 ctus medicamentorūmq; rationem
 non parum conducit. Naturarū pos-
 tremo inspiciendæ sunt proprietates,
 a quibus minime recedendū est.
 sunt etenim qui si ob aliquam causam
 paulo longius noctu vigilarint,
 omnino postea dormire non possint,
 quare a potu illi sunt arcendi, vti nō
 nulli quotidie videtur qui hunc cibum
 aut potum auersentur, quocirca
 ad eos non sunt inuitandi. sunt
 præterea qui carnem bubulam facile
 benèque concoquant, cum alijs tamen
 foret coquendo rebellis. Non
 solum autem ex ijs materiæ quæ ad
 victū pertinet suggeritur copia, sed
 etiam ex regione & tempore. ac ita
 demum tradita est methodo vètrici
 culi sicci curatio, quæ similis genere
 erit, corde, aut iecinore, vel denique
 toto corpore sic affecto: a quib⁹ tan-
 dem marasmus exoritur, tanto quidē
 pròptius, q̃to aliqua earū partiū

sic affectarū maioris est præstantiæ.

De mediocri frigore siccitati insigni adiuncto.

IAm nunc proponitur nobis composita intemperies modice calida, & sicca insigniter, quare curationis geminus est scopus: humectādū enī est in hac & modice calfaciendum. Vnde & aduertendum diligēter est, ne humido medicamento iunct⁹ sit insignis calor, qui humorē insumat. Noxæ autem quantitas in vtraque intemperie ad materię inuentionem viam monstrare potest: maxime enī siccitatis curatio id ipsum nūc ante demonstrauit. Modicæ vero, adeo scrupulosa victus ratione non indiget, quādoquidē nec vires ipsis funditus sunt collapsæ. Ideo enim difficilis est validæ siccitatis curatio, quoniam corpus reficiendum imbecilius factum sit: quod certe dum modice arefactum est, nec vires cōciderunt, vberius cibari postulat. in hac ergo cōstitutione similiter ac prius dictū est, humectabimus. Sed calfacientis materiæ admiscendū iam dis-

m. ij.

PERIOCHE VII.

Etis tantum erit, quantum particula
ad frigidius inclinavit. Mel itaque
vberius, vinū quoque calidius & an-
tiquius esto, omnia etiam ad calidi-
tatem tum potentialem, tum actua-
lem magis deflectāt oportet. Extrin-
secus subinde paranda sunt aut lini-
mēta, aut cerata ex melino, mastichi-
no, nardinove oleo, ne siccus rema-
neat vēter. cui optime fecerit super-
posita purpura, tū quòd modice cal-
faciat, tum adstringat. quæ enim ca-
lidiora sunt relaxant nimis, halitūq;
digerunt: quæ vero valenter adstrin-
gūt, præter modum ea siccant & fri-
gida sunt, nēpe acerba. Quare quod
ex ambobus mixtum est, minus quī-
dem calfacit quàm alterū. Siccatur ve-
ro non minus quàm vtrunque. Vbi
enim vtraque tum siccitas, tum fri-
giditas partē quandam valenter oc-
cupavit, admodū difficilis oritur cus-
randi ratio, cum is affectus nil aliud
pene sit quàm quoddam velut tabi-
dum senium. incipiēdum autem est
ab ijs quæ prius dicta sunt, mastichi-
num scilicet aut nardinū oleum pur

pura exceptū ad vētriculum fundendo. Mel quoq; vberius despumatum tamen cum lacte dandum: quod certe huic affectui veluti senibus aptissimū est nutrimentum. Vinum etiam antiquum eligendum: eoque antiquius quo maior fuerit frigiditas. optimū sane medicamentū foret quo vtūtur picatores ad renutritionē. Sed eatenus quidē calfaciendum est, donec vētriculi calor non quidē qualitate, sed substantia inaugeſcat, quod efficit quidem hæc victus ratio, maxime autem vinum. ex ijs postremo quæ foris applicantur optimū quidem foret ad motum puellum aut catulum, quidpiā mve tale optime temperatū, proxime vētri & abdomini adhærere, vt eius caloris vicinia inaugeatur vis coctrix ventriculi. fomenta tamen calida sicca præsertim, calida etiam humidāque insigniter vitabis. ac ita de hac intemperaturarum coniugatione hætenus sit satis.

De intemperie calida & sicca.

ADiungatur ab hinc siccitati superiorī calor non admodū multus.

PERIOCHE VII.

tus qui ventriculum affligat. Cuius
fane sic compositæ intemperiei cu-
ratio quantum ad siccitatem, ea erit
paulo ante scripta, mel tamen aut vi-
nosum vinum nō dabitur, sed mul-
tum aquosum, idq; actu frigidum,
vti & omnia fontanæ aquæ frigus
quod verno tempore ei inest proxi-
me imitentur, dum æstas viget opor-
tet: alioqui sub lactis tepore cibos
dedisse licet. Ventrículum oleo me-
lino, crudove inungemus, ac deniq;
tum frigida, tum humida ei parabi-
mus: illud nobis persuadentes, eius-
modi affectum ad portionem esse fe-
brem. Quinimo multi hallucinantur
in hoc ipso, putantes eos sic affectos
febrile, quod plurima simul febrium
adhereant symptomata, tum sitis ve-
hemens, tum inappetentia, ac deniq;
alia non pauca, quæ etiā Galeni præ-
ceptorib⁹ (vti refert) aliquando im-
posuerunt. Cuius certe affectionis
exemplū hoc vnum sequitur ex Ga-
leno. Natus quidā quadraginta an-
nos medio corporis habitu, siti gra-
uiter vexabatur, frigidam impense

Historia

flagitans, calidam auersabatur. Ven-
 triculus quæ sumpsisset tribus aut
 quatuor horis posteuomebat, simul
 cum potione calidæ aquæ, ac ita gra-
 cilis factus in periculum iam incli-
 nabat, dum aquam frigidam super
 cibû simul liberaliter hauriens om-
 nino sitire destitit, paulopost vero
 plurimum eius vomitione reiecit.
 Abhinc toto corpore horruit, reli-
 quam autem diem noctemque totâ
 in quiete cooperimentis se fouens
 (quæ prius ob ardorem abiiciebat)
 transegit. Excreuitque semel ad me-
 diam noctem mediocriter cocta. Ita
 que nec siticulosus præterea fuit. Po-
 stero autem die & coloratio & firmio-
 r multo est effectus. Lauatus quoque
 citra offensam, ac modice cibatus,
 tum melius quam ante venter con-
 coxit. Sed querebatur quægre trans-
 glutiret, idque visum est Galeno gu-
 lam fuisse refrigeratam ob immo-
 dicum argentis aquæ haustum, quam
 nemo sanare potuit. Quare vitio in-
 vitium mutato, tempore interposi-
 to mortuus est. Verum doctior fac-
 m. iiii.

PERIOCHE VII.

Actus Galenus huius miseri periculo,
Alterum alium sanauit pariter affectum, pri-
mū refrigerantia medicamenta pre-
cordijs imponendo, vnde protinus
ventriculi æstus est remissus. cæterū
homo suspiranti similiter respira-
bat, quare transuersum septum illi
esse refrigeratum contemplatus, ab-
iectis refrigeratorijs oleo calido lo-
cum fouit, donec motum naturalem
reciperet. Ac postea hominem sen-
sim refrigerando impositis à septo
umbilicum versus frigidis medica-
mentis persanauit, cibum tamen po-
tionemque omnem sub aquæ fontæ
ne frigiditate exhibuit.

De intemperie insigniter calida,
cum mediocri aut humiditas
te, aut siccitate.

Intemperies multum calida modi-
ce vero humida minori periculo
calidæ potione curabitur: quādo mi-
nime ex ea lædentur partes vicinæ,
vt quæ mediocriter se habeant. nam
in siccis affectibus, & quæ proxima
sunt, & totum denique corpus graci-
lus redditur. Aliquādo etiam adeo

vehemens ardor ventrē occupat, vt
ad cor ipsum perueniat: vnde homo
febricitat, periculosius quidem quo-
niam humidæ & siccæ intemperiei
ventris febris accessit. Quæ vero in Aucta hū
signis humiditas, siue cū calore aut miditas
frigore, siue sola affligit, omnium fa cum alia
cilime curatur: nepe ea ratione qua oppositi
prius dictum est empiricos non hāc one,
modo verum etiam reliquas intem-
peries curare. Cibi autem qui citra
valentem calorem aut frigus siccāt,
portionis etiam consuetæ parcitas so-
lam humiditatem profligant. eā rur-
sum caliditati coniunctam, ad strin-
gentium & ciborū & potionū vsus:
sint autē & hi austeri sine calfactio-
ne. Eius autem quæ frigiditati copu Humida,
lata est, præsidia omnia acris sunt, ac frigi-
quibus acris (citra tamen valens da,
frigus) admisceantur. Potio etiā exi-
gua vini admodum calentis veteris
que dabitur. Reliqua deniq; omnia
quæ foris adplicari solent ad eorum
quæ comesta & bibita sunt, portio-
nē institui debere notū est. At quoni-
am de ijs omnibus abunde tractatū

PERIOCHE VII.

est, in summam repetenda veniunt quæ hæcenus tradita sunt. calida igitur intemperies refrigeranda est, frigida vero calfaciēda, humida siccanda, & sicca humectāda. Quod si per copulationem aliquam duarum qualitatum intemperies consistat, miscēda amborum cōsilia sunt. Scire præterea licet harum omnium pessimā esse inter simplices siccam, in compositis siccam & frigidam. Atq; hoc loco finē habeant ventris intemperies, quas scilicet nullus extrinsecus alit superuacuos humor.

De intemperie ventris ex humoris vitio.

Ventriculum esse multorum succorum ibidem generatorū vel aliunde influentium sentinam ac receptaculum, tum ratio, tum experientia confirmat, vnde contingit ipsum frequenter varie intemperatura diuexari. Succus enī ille copia aut qualitate vitiosus in ipso ventris spatio continetur, aut tunicis eiusdem infarcitur: ille vomitione, aut alui deiectione purgatur: hic vero attenuatur.

ri si crassus, detergeri vero si viscosus est prius debet, ac ita in spatium inane, liquefscens deuolutus, eodem quo prius modo euacuabitur. qui profecto pro sua dispositiōe variam, vt ante dictū est, inuehit intemperiem, nūc quidem calidā aut frigidā, nunc etiam humidā vel siccam, aut deniq; ex ijs coniugium. Sin aliunde confluit humor, diligenter discerni debet. Nam curatio causa cognita facile se se insinuat. Sēpenumero quidē monstratum est humorem redūdantem ex alijs in alias partes defluere, veluti ex capite, aut iocinore, aliisque partibus in ventriculum. In qua profecto affectiōe curandū est id quod trāsmittit: de ventre autē tantisper esse sollicitum oportet ne prompte recipiat quæ confluunt. quod fiet & adstringentibus, vti fieri solet in principio omnium fluxuū, & ijs quæ tēperiei mediocritatem restituere, aut Quid in conferuare possunt. Ergo primum omni deest videndum in omni destillatione stillatiōe an corpus sit cacochymum, an pleo primo est thoricum. illud erit primū pharma curandū.

PERIOCHE VII.

co ecphractico, seu purgante curan-
 dum: hoc vero vel sanguinis missio-
 ne, vel quodam ex ijs quæ ei virtute
 respondent, vacuandum, tum postea
 parti præsidia admouenda. Sed con-
 tingit aliquando neutrum eorum esse
 se causam, aut fomitem defluxionis.
 quare aliò est confugiendum, viden-
 dumque an aliqua consueta excretio
 ut sunt hæmorrhoids, menstruus flux-
 us, & alia plurima suppressa fuerit:
 aut morbus aliquis qui certis perio-
 Quæ fluxus diu exabat, non eo tempore con-
 xionē irritabat: aut denique mutilum sit ali-
 ritare pos- quod membrum quod iam non nu-
 sunt. tritur, vnde humor nunc in ventri-
 culum relabitur. Quibus sic confide-
 ratis si quidem ex minus momenta-
 neis translatio sit, rursus ad ea reuel-
 les: sin ex ijs quæ maioris sunt mo-
 mēti, ambobus simul consules, sub-
 mouens eum semper affectū qui flux-
 xionem excitet. fiet id si omnes cor-
 poris partes ad bonam habitudinē
 reducamus, ac omnes naturales ex-
 pulsiones fluxiles semper reddamus.
 Porro quum plures iam dies delata

in ventrē superflua sunt, solet is contrahere sibi aliquid vitij ex eorum malitia. quocirca opportune potione ex absynthio, seu syrupum ex eo qui nūc passim inuenitur, propinabimus, ac legitima victus ratione & frictione inunctioneq; ventrē in pristina naturam vindicabimus. Intemperies vero quæ ex noxiæ fluxionis temperamento contracta est, si paucos durauit dies, facile: si multos, ægre contrarijs profligabitur.

De succo vitioso tunicis ventriculi inhærente, cui bene facit hiera picra.

DVm ventris tunice vitioso succo madent, curatio petitur ab ijs quæ non feruntur profundius in corpus, ne simul rapiāt illum in corporis habitum. de qua re abunde dictum est Gale. libro quarto de tuenda bona valetudine: quale est quod picram vocāt. hæc enim vētrem in Hierapicra testināque roborat. humorem ad cræ commostringendo expungit, succos in capis moditate ac primis venis contentos ob aromata quæ immixta sunt, attenuat flu

PERIOCHE VII.

xilésque reddit, ac denique omnibus
affectibus ex pituitoso humore ora-
tis ita generose auxiliatur, vt mul-
tos prima statim potione sanarit. cu-
ius hæc est descriptio, quam vbique
inuenias. ꝑ. cinamomi optimi, xylo-
balsami, asari, spicæ nardī, croci, ma-
stiches gummosę, ana drachmas sex,
aloes lotæ, si minus vis soluere, plus
autem roborare, drachmas centum:
tundantur in puluerem, ac cum succo
absynthij formentur, si lubet, cas-
tapotia, aut melle excipiatur despu-
mato, vel deniq; puluis in phiala cõ-
seruetur. quibus certe modis etiam
ad ventriculi, capitis, intestinorũ
que affectus præparatam comperies.
Verum quibus lenta ventriculo inflo-
git pituita, ijs prius dissecãtia exhi-
benda sunt, ac deinde purgantia, aut
ad vomẽdum, si ad id proni sint, per
radiculam ex oxymelite (quod nunc
habetur) scillitico excitabuntur. sin
nec lētus humor sit, nec crassus, vti
que abunde sit à ptisanæ solius cres-
more, item à mulsa vomuisse. Idos-
neum vero est & si mulsa in qua sit

incoctum absynthium bibatur. Nam id quoque tenues succos in ore ventriculi cōtentos commodē deorsum Sexto de pellit : crassos autem ventri affigit, tuenda scilicet cū detergendi vim non habeat, quæ nitate, adeo sit æstīmanda.

Triplicem inesse ventriculo affectum, qui simul aliquando, vel seorsim exagitat, curandiq; huius methodum cæteris implexibus morborum esse cōmunē.

TRiplicem affectum ventrem simul, ac vnumquēq; seorsim occupare posse nemo ambigit, ita vt & ipsæ partes solidæ laborent, & mali succi ita ventri sint infixi, vt elui facile nequeāt, & alij in interno eius sinu contineātur. Potest namq; interim primus affectus esse cum secūdo, vti hic cum tertio: ac tertius cum primo. sæpe etiam, vt dictum est, omnes simul. Pro quibus repetenda sunt animo quæ tradita erant antea de complexu affectuum in vlceribus. Verū quoniam sese offert tam opportuna occasio, breuiter methodum ad omnem affectuum complexionem cum

PERIOCHE VII.

Method⁹ quam aduertas oportet, quoniā post
ad omnē hac eam repetituri non sumus. Pri
affectuū mum igitur in huiusmodi comple
complexu affectuum non modo ventris, sed
xionem. omnium aliarum partium cōsideran
da tria proponuntur: primo affectus
vnde maxime periculum imminet
ægro: Secundo quid ex ijs habet rae
tionem causæ, & quid affectus: Tero
tio quæ sanari ante alia possint, vel
nō possint. vbi enim à quoquam affe
ctuū periculū ægro instat, ad id quod
vrget primum curatio est dirigēda.
Id autem quod habet rationem caus
sæ auferendū prius est, secundo mor
bus curabitur. cum præterea vnus
absque alio curari non potest, ordo
est obseruandus. Dum autem quod
magis vrget curatur, affectus magni
tudo perpendenda est: quæ ex actio
nis partisq; læsæ præstantia, propria
do vnde affectuū essētia, facultate deniq; cor
deprehē pus nostrum moderante deprehens
ditur. ditur. Causa vero dum adimitur, cō
siderādum est quid eorum quæ cons
iūcta sunt augere, gignerēve reliqua

potest: quæ præterea gignuntur, vel incrementum hinc accipiunt. In ordine vero obseruandum quid à quo, quid cum quo, ac quid post quid curari possit. Quæ omnia facile ob oculos ponuntur exemplo præsentis de vêticulo. à quo non discedêtes, rursum exordiamur. Fingatur itaque ex cerebro in ventrem defluere superfluum quædam humorem frigidum, ex quo contracta iam sit intemperies frigida in eo, ad hæc malum iam succum inania spatiola partium similariū ventris occupauisse. In hoc exemplo triplex est affectus: defluxio, mali succi partibus similaribus infarctio, ac ventriculi intemperies: quæ dignitate reliquos duos affectus vincit. nam temperies etiam dignitate maior est, quoniã ab ea omnis actio pendet. contrariorum autem eadem est disciplina. Esto præterea si libet horum trium maximus affectus, succus imbibitus, rosioni scq; sensum faciat, vnde animi defectus multusque sudor accersatur, ita videlicet vt quatenus supra vires est, reliquis sit ma-

n.j.

PERIOCHE VII.

Methodi
capro
positio.

ior. Constat igitur primo adhiben
dam esse curam, vt ei quod vires res
soluit, nempe animi deliquio, succur
ratur. Vbi autem id mediocriter se
habuerit, ac neque vires amplius la
bent, neque plurimum vitiosi succi
in ventre sit: tum nimirum ad caus
sam accedes: qua permanēte, affectus
ex ea natus perfecte sanari non po
test. Ordo autē curationis modo cō
traria inter se remedia, vt in vlcere
cui adiungitur phlegmone indicat:
modo alteri affectui nihil nocet, sicut
in proposito nunc casu. nam educto
humore qui innatat in sinu ventris,
alimentū illius qui est imbibitus tu
nicis eius plane adimit. Æque & qui
cerebrū ita firmat ne quam sensib
lem redundantiam creet, is profecto
veluti fontem fluxionis in ventrem
destruit: atq; ita curationis ordo cū
ordine causarū in ijs consentit, quā
quam in alijs non raro dissentit. Ve
rum quod ex affectus magnitudine
spectatur, id distingui prout dictum
est debet, ac primū quidem me
dicamentorū materiam ei quod ma

imum est accommodabis, deinde pro
 caussarum ordine toto curabis. Por-
 rò si copia notabilis excrementorum
 nec in capacitate, nec in tunicis eius
 fuerit, sed neq; rosio quæ viribus of-
 ficiat: tum omnium primū sanādum
 ipsum cerebrum est: ab hoc sinus ip-
 se ventris vacuandus extergendūsq;
 est, postea ipsæ tunica expurgandæ,
 postremo intemperiei contrarijs est
 medendum. Ac ita demum non mo-
 do ventris, sed reliquarum quoque
 partium intemperaturas seu puras,
 seu quas alit superfluous humor per-
 sanabis: euariata tamen ratione me-
 dendi pro diuersis partium, natura,
 officio, figura, situ & sensus acrimo-
 nia vel hebetudine. de quibus pro v-
 niuersali curādi methodo pauca sunt
 ex Galeno adiungenda.

De indicationibus, ac primo à
 partis temperatura.

A Partis temperie seu natura in-
 dicatio ita sumi debet, vt quæ
 particula calidior est natura, si frigo-
 re laboret, hæc & liberalius & diu-
 tius cal fieri postulat. Quippe eatenus

n. ij.

PERIOCHE VII.

Theorema.

redeat ad eorum naturam vnum quodque necesse est, quatenus à natura recessit: ac veluti quadā via retroferatur quę in diuersum agat ei, quę facta in ipso est transmutationi. Contrā vero, pars natura calidior, si calido morbo vexetur, exigua breuivse tēporis refrigeratione æget, sicut frigidior calfactione. Vnde etiā minus periclitantur quicunq; cognato naturæ suæ morbo laborāt. ac quē admodum de calidis frigidisq; temperaturis proponitur mihi, de reliquis tum simplicibus tum compositis intelligendum postulo.

A partis officio.

A Particula rursus cuius officiū est vel commune & vtile omnibus corporis partibus, aut paucis quibusdam, aut denique sibi vni, dum simplici, id est sine humoris vitio, in tēperie laborat, nihil indicatur. Nā, vt reliquę partes, cōtrarijs curari postulat: in ijs autē quas fouet superua cuius humor, si particula sibi soli inserviat, audacter vacues licet, prout affectus suadebit, sed tamē virtuti atq;

tentus. Sin necessarium sit eius opus
 omnib⁹ animalis partib⁹, vti vētris
 & iocinoris, non leuis habēda est so-
 llicitudo de robore virium, ne hanc
 magna semel vacuatione vsus dissol-
 uas. Quare bene admonetur libello
 artis parua^e capite xcv. admiscendū
 semper esse medicamentis soluenti-
 bus & laxantibus aliquid ex ijs quæ
 robur partis publicum munus ha-
 bentis conseruant. Commune siquis
 dem est opus cordis, arteriarum, ve-
 narum, thoracis, vtriusque vesicæ, ac
 vasorum ab vtraque procedentium.
 Cerebri vero, cum sani sumus, ad vo-
 luntarias actiones est opus muscu-
 lis quibus eas obimus: nō autē, dum
 ægrotamus, nisi ijs quibus delega-
 tum est respirationis officium. Re-
 liquorum vero organorum actio
 certe non est, ministerium vero ad
 vitam est necessarium, veluti pul-
 monis, asperæ arteriæ, & faucium.
 Quare ex eiusmodi partibus q̄pri-
 mum vacuare redundantiam licet,
 prout volueris. Ex ventre autem &
 iocinore cautio est adhibenda, ne
 n. iij.

Partium
 actiones
 cōparan-
 tur.

PERIOCHE VII.

quid virtuti noceas. Præterea cum non eadem sit actionum dignitas omnibus partibus, ad portionem dignitatis actionum, etiam cuiusque partis robori prospiciendum est. Maxima enim est cordis officij dignitas, atque omnibus ægrotantibus maxime necessaria. Cerebri ad vitam par est momentum, non tamen par robur eius in ægrotis requiritur: cum satis abunde fuerit, si tantum eius servatum sit, quo respirationis munus sit obeundum. At iocinoris ventriculique opus omnibus particulis est pernecessarium: non tamen adeo saltem perpetuam necessitatem habet, sicuti ipsius cordis. Quocirca intelligens partium omnium tum actiones tum usus, quatenus cuiusque robur custodiri oporteat facile inueniet. Ad eundem vero modum partium robur quæ alijs sunt facultatum authores, servare decet, pro facultatis eorum usus portione: quo vides licet illis animalis partibus subministrant. Cerebrum enim nervis ac musculis, cor arterijs, iecur venis

suppeditat virtutem.

A partis figura, situ, ac sensus dispositione.

Partis figuram veluti situm non parum iuuare ad cognoscendum quonam modo sint vacuanda excrementa docuit superior disputatio, vbi de pulmonis affectibus agebatur. venter enim, vt paulo ante dictum est, vomitu aut deiectione inanitur, intestina sola alui deiectione, sicut iocinos ris caua. Eius vero gibba, renes, & vesica, dum multo viscosoque humore inundant, per aluū: dum pauco, per vrinales meatus expurgantur: Cerebrum vero per palatum, nares, & aures: Pectus & pulmones per tracheam arteriam. A situ præterea indicatio tum ad solidorum intemperiem, tum succorum vitium non levis erit. Nam intemperies summę cutis facilius quàm intimarum partium discutitur: quoniā si eò deferenda præsidiorum vis est, profecto, ne in viā elanguescat, augenda erit. Quid postremo partium sensus hebes vel acutus indicet, omnib⁹ palā est. pars enim,

n. iiii.

PERIOCVII. THER.

vt est oculus, neruus, aut præputiũ,
facile dolore qui à violento medica
mine infertur resoluitur. quare tam
insigni sensu præditas particulas nec
confertim, nec semel vacuare tenta
bis, sed tuto potius in tempore. At
vbi sensus est obtusior, in ijs etiam
celeriter obire quod iustum est licet
semel vsis remedio idoneo. Verum
omnia huc trāsferre nō suscepimus,
quin potius breui compendio artis
medicæ studiosis quos potuimus ex
libris Therapeutices perstrin
gere studuimus. Reliquos
non licuit, quòd in il
lis ea sit vsus scri
bendi via
ac me
tho
do Gale
nus, vt nihil
quod sententiam non
mutilet amputari possit.

FINIS SEPTIMAE
PERIOCHES.

INDEX BREVIS EORVM
quæ hoc libello continentur.

PRIMAE PERIOCHES.

Quare in Theſſalũ inuectus ſit Ga-
lenus. fo. 4

Methodus dicendorum in his com-
mentarijs. 5

Contra Theſſalũ & Olympicũ ſani-
tatẽ & morbũ male definiẽtes. 6

Quatuor eſſe in hac methodo ordi-
ne conſtituenda. 7

Olympicũ male pathos & ſympto-
ma diſtinxiffe. 8

SECUNDÆ PERIOCHES.

Quid pathos, quidve morbus ſit, cui
vni parãtur remedia, docetur. 10

Morborũ numerũ inueniri nõ poſſe,
niſi actionũ cauſas perſpectas ha-
beamus. 11

Solidas partes intemperie frequẽter
laborare, cõtra Eraſiſtratum. 13

Quid indicatio, & quãtum poſſit in
curandi methodo. 15

INDEX.

- Morbum omnem vnum specie esse,
multitudine autem diuersum. 16
Morbum vnum genere esse, ac eum
ipsum quippiam esse. 18

TERTIAE PERIOCHES.

- Vnde in morbis curandis præcipue
sumitur indicatio. 19
De vlcere simplici & cauo, ad quod
omne medicamen sarcoticum in-
discriminatim vsurpat Empiric-
us. 20
Carnis generandæ causâ duplex, cui
inseruit sarcoticum medicamen-
tum detergens & siccans circiter
ordine primo. 22
Seruandam esse partis temperiem,
vlcus tamen semper siccandū, quā-
titatem postremo in curatione in-
telligi, aut præcipi non posse. 23
De simplici vlcere curando 24
De inducenda cicatrice. 26
De carnis immodica excrescētia. 27
De affectibus solutæ vnitioni per-
mixtis. 28
In curatione tum vlceris, tum alio

INDEX

rum affectuum sæpe indicari contraria, incipiendumque esse ab eo, sine quo alterum curari non potest. 29

De ulcerum simplicium & compositorum proprijs differentijs, quæ curando suam indicationem habent. 30

QUARTAE PERIOCHES.

Esse prius corrigenda vitia quæ ulceris curationem impediunt. 33

Externam seu primitivam causam nihil ad curationem, sed ad affectus cognitionem conferre. 34

De ulcere maligno seu cacoëthe, quod parum apte curavit Thessalus. 36

De ulcere obducto cicatrice, ac de novo redeunte. 37

Hippocrates ab ipsius rei essentia, non autem temporis diuturnitate indicationem perpetuo cepit: qui vlcus semper siccandum esse (nisi pus quæcelerrimè generari oporteat) suadet. 39

Ab affectus magnitudine indicatio

INDEX.

- nem fumi, quem vehementē red-
dit partis præstantia, symptomatū
magnitudo, ac affectus maligni-
tas. 41
- A partis sensus acrimonia & hebe-
tudine, eiusque positu & figura su-
mendā esse indicationem. 42
- Ecchymomatū curatio, indicatione
capta à situ partis. 44

QVINTAE PERIOCHES.

- De causis hæmorrhagiæ ex venarū
vulceribus. 45
- De supprimendo sanguine ex vaso-
rum sanguineorum sectione in su-
perficie corporis. 46
- De venarū & arteriarum deligatu-
ra, ac emplastico medicamine. 48
- Escharam sæpe gignendā, dum vro-
get necessitas. 49
- De vasorum sanguineorum vulne-
ribus in profundo corpore. 51
- Arteriam experiētia & ratione coar-
lescere probatur. 53
- De pulmonum vlceribus quæ ægre
curantur. 54

INDEX.

Esse obseruandam naturam, situm,
figuramq; partis. 55

De vlcere mēbranæ interioris, aspe-
ræ arteriæ, ac de Tabiarum lacte
quod phthificis prodest. 57

De sanguinis è pulmonibus reiectio-
ne ob catarrhi in eos defluxum, ac
instrumentorum spiritus refrige-
rium. 58

De pulmonum vlcere ex vitiosi suc-
ci erosione. 60

SEXTAE PERIOCHES.

Duriorum corporum curationē hoc
libro tradi, varias quoq; vulneris
neruorum differentias esse. 63

De nerui puncti curatione 64

De neruo rectà cæso, eiusque curan-
di ratione. 65

De neruo transuersim cæso. 67

De neruorum contusione. 68

De ligamentorum ac tendinum ex-
ulceratione. eodem.

De abdominis vulnere, ac curatio-
ne. 69

De fracturarum ossis differentia, &

I N D E X.

curacione in vniuersum.	71
De curacione ossis fracti secundum transuersum.	72
Quo tempore soluenda ossium de- ligatura.	74
De ossium contusione.	76
De capitis vulnerum differentijs ac curacione.	77
De curacione fracturarum & contu- sionum cranij, ac quib ⁹ in ea ipsa instrumentis vtendum.	78

S E P T I M A B P E R I O C H E S.

Omnis intēperiei curandæ ratio ge- neratim mēbratimq; traditur.	80
De sicca ventriculi intemperie ob consumptionem roridæ substan- tiæ.	83
Historia de ventriculi penè tabesce- nti curacione.	84
De succo vitioso tunicis ventriculi inhærente, cui benefacit hiera pio- ra.	87
De mediocri frigore siccitati infie- gni adiuncto.	90
De intemperie calida & sicca.	91

I N D E X.

De intemperie insigniter calida, cū
mediocri aut humiditate aut sic-
citate. 92

De intemperie ventris ex humoris
vitio. 93

De cibo ac potu huius ægrotātis. 94

Triplicem inesse ventriculo affectū,
qui simul aliquando, vel seorsim
exagitat: curandiq; huius metho-
dum cæteris implexibus morbo-
rum esse communem. 96

De indicationibus, ac primo à partis
temperatura. 98

A partis officio. eodem

A partis figura, situ, ac sensus dispos-
itione. 99

INDICIS FINIS.

